

Nombres complexes

1 Forme cartésienne, forme polaire

Exercice 1

Mettre sous la forme $a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) les nombres :

$$\frac{3+6i}{3-4i} ; \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} ; \frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}.$$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000001]

Exercice 2

Écrire sous la forme $a + ib$ les nombres complexes suivants :

1. Nombre de module 2 et d'argument $\pi/3$.
2. Nombre de module 3 et d'argument $-\pi/8$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000003]

Exercice 3

Calculer le module et l'argument de $u = \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$ et $v = 1 - i$. En déduire le module et l'argument de $w = \frac{u}{v}$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000011]

Exercice 4

Déterminer le module et l'argument des nombres complexes :

$$e^{e^{i\alpha}} \quad \text{et} \quad e^{i\theta} + e^{2i\theta}.$$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000013]

2 Racines carrées, équation du second degré

Exercice 5

Calculer les racines carrées de 1, i , $3 + 4i$, $8 - 6i$, et $7 + 24i$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000027]

Exercice 6

1. Calculer les racines carrées de $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$. En déduire les valeurs de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$.
2. Calculer les valeurs de $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

Exercice 7

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

$$\begin{aligned} z^2 + z + 1 = 0 & \quad ; \quad z^2 - (1 + 2i)z + i - 1 = 0 & \quad ; \quad z^2 - \sqrt{3}z - i = 0 & \quad ; \\ z^2 - (5 - 14i)z - 2(5i + 12) = 0 & \quad ; \quad z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0 & \quad ; \quad 4z^2 - 2z + 1 = 0 & \quad ; \\ z^4 + 10z^2 + 169 = 0 & \quad ; \quad z^4 + 2z^2 + 4 = 0. \end{aligned}$$

3 Racine n -ième**Exercice 8**

Calculer la somme $S_n = 1 + z + z^2 + \dots + z^n$.

Exercice 9

1. Résoudre $z^3 = 1$ et montrer que les racines s'écrivent $1, j, j^2$. Calculer $1 + j + j^2$ et en déduire les racines de $1 + z + z^2 = 0$.
2. Résoudre $z^n = 1$ et montrer que les racines s'écrivent $1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1}$. En déduire les racines de $1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} = 0$. Calculer, pour $p \in \mathbb{N}$, $1 + \varepsilon^p + \varepsilon^{2p} + \dots + \varepsilon^{(n-1)p}$.

Exercice 10

Trouver les racines cubiques de $2 - 2i$ et de $11 + 2i$.

Exercice 11

1. Soient z_1, z_2, z_3 trois nombres complexes distincts ayant le même cube.
Exprimer z_2 et z_3 en fonction de z_1 .
2. Donner, sous forme polaire, les solutions dans \mathbb{C} de :

$$z^6 + (7 - i)z^3 - 8 - 8i = 0.$$

(Indication : poser $Z = z^3$; calculer $(9 + i)^2$)

4 Géométrie

Exercice 12

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que :

1. $\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = 1,$

2. $\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000060]

Exercice 13


Montrer que pour $u, v \in \mathbb{C}$, on a $|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2)$. Donner une interprétation géométrique.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000069]

Exercice 14

Soit $(A_0, A_1, A_2, A_3, A_4)$ un pentagone régulier. On note O son centre et on choisit un repère orthonormé (O, \vec{u}, \vec{v}) avec $\vec{u} = \overrightarrow{OA_0}$, qui nous permet d'identifier le plan avec l'ensemble des nombres complexes \mathbb{C} .



1. Donner les affixes $\omega_0, \dots, \omega_4$ des points A_0, \dots, A_4 . Montrer que $\omega_k = \omega_1^k$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Montrer que $1 + \omega_1 + \omega_1^2 + \omega_1^3 + \omega_1^4 = 0$.
2. En déduire que $\cos(\frac{2\pi}{5})$ est l'une des solutions de l'équation $4z^2 + 2z - 1 = 0$. En déduire la valeur de $\cos(\frac{2\pi}{5})$.
3. On considère le point B d'affixe -1 . Calculer la longueur BA_2 en fonction de $\sin \frac{\pi}{10}$ puis de $\sqrt{5}$ (on remarquera que $\sin \frac{\pi}{10} = \cos \frac{2\pi}{5}$).
4. On considère le point I d'affixe $\frac{i}{2}$, le cercle \mathcal{C} de centre I de rayon $\frac{1}{2}$ et enfin le point J d'intersection de \mathcal{C} avec le segment $[BI]$. Calculer la longueur BI puis la longueur BJ .
5. **Application:** Dessiner un pentagone régulier à la règle et au compas. Expliquer.

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000077]

5 Trigonométrie

Exercice 15

Soit z un nombre complexe de module ρ , d'argument θ , et soit \bar{z} son conjugué. Calculer $(z + \bar{z})(z^2 + \bar{z}^2) \dots (z^n + \bar{z}^n)$ en fonction de ρ et θ .

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000020]

Exercice 16

En utilisant les nombres complexes, calculer $\cos 5\theta$ et $\sin 5\theta$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000080]

6 Divers

Exercice 17

Soit $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib ; a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que si α et β sont dans $\mathbb{Z}[i]$ alors $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ le sont aussi.
2. Trouver les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$, c'est-à-dire les éléments $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ tels qu'il existe $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ avec $\alpha\beta = 1$.
3. Vérifier que quel que soit $\omega \in \mathbb{C}$ il existe $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|\omega - \alpha| < 1$.
4. Montrer qu'il existe sur $\mathbb{Z}[i]$ une division euclidienne, c'est-à-dire que, quels que soient α et β dans $\mathbb{Z}[i]$ il existe q et r dans $\mathbb{Z}[i]$ vérifiant :

$$\alpha = \beta q + r \quad \text{avec} \quad |r| < |\beta|.$$

(Indication : on pourra considérer le complexe $\frac{\alpha}{\beta}$)

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000096]

Indication pour l'exercice 1 ▲

Pour se "débarrasser" d'un dénominateur écrivez $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$.

Indication pour l'exercice 2 ▲

Il faut bien connaître ses formules trigonométriques. En particulier si l'on connaît $\cos(2\theta)$ ou $\sin(2\theta)$ on sait calculer $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

Indication pour l'exercice 3 ▲

Passez à la forme trigonométrique. Souvenez-vous des formules sur les produits de puissances :

$$e^{ia} e^{ib} = e^{i(a+b)} \text{ et } e^{ia} / e^{ib} = e^{i(a-b)}.$$

Indication pour l'exercice 4 ▲

Pour calculer un somme du type $e^{iu} + e^{iv}$ il est souvent utile de factoriser par $e^{i\frac{u+v}{2}}$.

Indication pour l'exercice 5 ▲

Pour $z = a + ib$ on cherche $\omega = \alpha + i\beta$ tel que $(\alpha + i\beta)^2 = a + ib$. Développez et indentifiez. Utilisez aussi que $|\omega|^2 = |z|$.

Indication pour l'exercice 6 ▲

Il s'agit de calculer les racines carrées de $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{4}}$ de deux façons différentes.

Indication pour l'exercice 7 ▲

Pour les équation du type $az^4 + bz^2 + c = 0$, poser $Z = z^2$.

Indication pour l'exercice 8 ▲

Calculer $(1 - z)S_n$.

Indication pour l'exercice 12 ▲

Le premier ensemble est une droite le second est un cercle.

Indication pour l'exercice 13 ▲

Pour l'interprétation géométrique cherchez le parallélogramme.

Indication pour l'exercice 15 ▲

Utiliser la formule d'Euler pour faire apparaître des cosinus.

Indication pour l'exercice 16 ▲

Appliquer deux fois la formule de Moivre en remarquant $e^{i5\theta} = (e^{i\theta})^5$.

Correction de l'exercice 1 ▲

Remarquons d'abord que pour $z \in \mathbb{C}$, $z\bar{z} = |z|^2$ est un nombre réel, ce qui fait qu'en multipliant le dénominateur par son conjugué nous obtenons un nombre réel.

$$\frac{3+6i}{3-4i} = \frac{(3+6i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} = \frac{9-24+12i+18i}{9+16} = \frac{-15+30i}{25} = -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i.$$

Calculons

$$\frac{1+i}{2-i} = \frac{(1+i)(2+i)}{5} = \frac{1+3i}{5},$$

et

$$\left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 = \left(\frac{1+3i}{5}\right)^2 = \frac{-8+6i}{25} = -\frac{8}{25} + \frac{6}{25}i.$$

Donc

$$\left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} = -\frac{8}{25} + \frac{6}{25}i - \frac{3}{5} + \frac{6}{5}i = -\frac{23}{25} + \frac{36}{25}i.$$

Soit $z = \frac{2+5i}{1-i}$. Calculons $z + \bar{z}$, nous savons déjà que c'est un nombre réel, plus précisément : $z = -\frac{3}{2} + \frac{7}{2}i$ et donc $z + \bar{z} = -3$.

Correction de l'exercice 2 ▲

1. $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 2(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1 + i\sqrt{3}$.

2. $z_2 = 3e^{-i\frac{\pi}{8}} = 3 \cos \frac{\pi}{8} - 3i \sin \frac{\pi}{8} = \frac{3\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} - \frac{3i\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

Il nous reste à expliquer comment nous avons calculé $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$: posons $\theta = \frac{\pi}{8}$, alors $2\theta = \frac{\pi}{4}$ et donc $\cos(2\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(2\theta)$. Mais $\cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1$. Donc $\cos^2 \theta = \frac{\cos(2\theta)+1}{2} = \frac{1}{4}(2+\sqrt{2})$. Et ensuite $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{1}{4}(2-\sqrt{2})$. Comme $0 \leq \theta = \frac{\pi}{8} \leq \frac{\pi}{2}$, $\cos \theta$ et $\sin \theta$ sont des nombres positifs. Donc

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}} \quad , \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}.$$

Correction de l'exercice 3 ▲

Nous avons

$$u = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}i}{2} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

puis

$$v = 1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Il ne reste plus qu'à calculer le quotient :

$$\frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{-i\frac{\pi}{6}+i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{12}}.$$

Correction de l'exercice 4 ▲

D'après la formule de Moivre pour $e^{i\alpha}$ nous avons :

$$e^{e^{i\alpha}} = e^{\cos \alpha + i \sin \alpha} = e^{\cos \alpha} e^{i \sin \alpha}.$$

Or $e^{\cos \alpha} > 0$ donc l'écriture précédente est bien de la forme "module-argument".

De façon générale pour calculer une somme du type $e^{iu} + e^{iv}$ il est souvent utile de factoriser par $e^{i\frac{u+v}{2}}$. En effet

$$\begin{aligned} e^{iu} + e^{iv} &= e^{i\frac{u+v}{2}} \left(e^{i\frac{u-v}{2}} + e^{-i\frac{u-v}{2}} \right) \\ &= e^{i\frac{u+v}{2}} 2 \cos \frac{u-v}{2} \\ &= 2 \cos \frac{u-v}{2} e^{i\frac{u+v}{2}}. \end{aligned}$$

Ce qui est proche de l'écriture en coordonnées polaires.

Pour le cas qui nous concerne :

$$z = e^{i\theta} + e^{2i\theta} = e^{i\frac{3\theta}{2}} \left[e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right] = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{3\theta}{2}}.$$

Attention le module dans une décomposition en forme polaire doit être positif ! Donc si $\cos \frac{\theta}{2} \geq 0$ alors $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est le module de z et $3\theta/2$ est son argument ; par contre si $\cos \frac{\theta}{2} < 0$ le module est $2|\cos \frac{\theta}{2}|$ et l'argument $3\theta/2 + \pi$ (le $+\pi$ compense le changement de signe car $e^{i\pi} = -1$).

Correction de l'exercice 5 ▲

Racines carrées. Soit $z = a + ib$ un nombre complexe avec $a, b \in \mathbb{R}$; nous cherchons les complexes $\omega \in \mathbb{C}$ tels que $\omega^2 = z$. Écrivons $\omega = \alpha + i\beta$. Nous raisonnons par équivalence :

$$\begin{aligned} \omega^2 = z &\Leftrightarrow (\alpha + i\beta)^2 = a + ib \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = a + ib \end{aligned}$$

Soit en identifiant les parties réelles entre elles ainsi que les parties imaginaires :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = a \\ 2\alpha\beta = b \end{cases}$$

Sans changer l'équivalence nous rajoutons la condition $|\omega|^2 = |z|$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \alpha^2 - \beta^2 = a \\ 2\alpha\beta = b \end{cases}$$

Par somme et différence des deux premières lignes :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \\ \beta^2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \\ 2\alpha\beta = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \\ \beta = \pm \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \\ \alpha\beta \text{ est du même signe que } b \end{cases} \end{aligned}$$

Cela donne deux couples (α, β) de solutions et donc deux racines carrées (opposées) $\omega = \alpha + i\beta$ de z .

En pratique on répète facilement ce raisonnement, par exemple pour $z = 8 - 6i$,

$$\begin{aligned} \omega^2 = z &\Leftrightarrow (\alpha + i\beta)^2 = 8 - 6i \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = 8 - 6i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 8 \\ 2\alpha\beta = -6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = 10 \text{ le module de } z \\ \alpha^2 - \beta^2 = 8 \\ 2\alpha\beta = -6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha^2 = 18 \\ \beta^2 = 1 \\ 2\alpha\beta = -6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \\ \beta = \pm 1 \\ \alpha \text{ et } \beta \text{ de signes opposés} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \text{ et } \beta = -1 \\ \text{ou} \\ \alpha = -3 \text{ et } \beta = +1 \end{cases} \end{aligned}$$

Les racines de $z = 8 - 6i$ sont donc $\omega_1 = 3 - i$ et $\omega_2 = -\omega_1 = -3 + i$.

Pour les autres :

- Les racines carrées de 1 sont : $+1$ et -1 .
- Les racines carrées de i sont : $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.
- Les racines carrées de $3 + 4i$ sont : $2 + i$ et $-2 - i$.
- Les racines carrées de $7 + 24i$ sont : $4 + 3i$ et $-4 - 3i$.

Correction de l'exercice 6 ▲

Par la méthode usuelle nous calculons les racines carrées $\omega, -\omega$ de $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, nous obtenons

$$\omega = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}},$$

qui peut aussi s'écrire :

$$\omega = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}} + i\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}.$$

Mais nous remarquons que z s'écrit également

$$z = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

et $e^{i\frac{\pi}{8}}$ vérifie

$$\left(e^{i\frac{\pi}{8}}\right)^2 = e^{\frac{2i\pi}{8}} = e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Cela signifie que $e^{i\frac{\pi}{8}}$ est une racine carrée de z , donc $e^{i\frac{\pi}{8}} = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ est égal à ω ou $-\omega$. Comme $\cos \frac{\pi}{8} > 0$ alors $e^{i\frac{\pi}{8}} = \omega$ et donc par identification des parties réelles et imaginaires :

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}.$$

Correction de l'exercice 7 ▲

Équations du second degré. La méthode générale pour résoudre les équations du second degré $az^2 + bz + c = 0$ (avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$) est la suivante : soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant complexe et δ une racine carrée de Δ ($\delta^2 = \Delta$) alors les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}.$$

Dans le cas où les coefficients sont réels, on retrouve la méthode bien connue. Le seul travail dans le cas complexe est de calculer une racine δ de Δ .

Exemple : pour $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$, $\Delta = 3 + 4i$, dont une racine carrée est $\delta = 2 + i$, les solutions sont donc :

$$z_1 = \frac{\sqrt{3} + 2 + i}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{\sqrt{3} - 2 - i}{2}.$$

Les solutions des autres équations sont :

- L'équation $z^2 + z + 1 = 0$ a pour solutions : $\frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3})$, $\frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$.
- L'équation $z^2 - (1 + 2i)z + i - 1 = 0$ a pour solutions : $1 + i$, i .
- L'équation $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$ a pour solutions : $\frac{1}{2}(2 - \sqrt{3} + i)$, $\frac{1}{2}(-2 - \sqrt{3} - i)$
- L'équation $z^2 - (5 - 14i)z - 2(5i + 12) = 0$ a pour solutions : $5 - 12i$, $-2i$.
- L'équation $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$ a pour solutions : $2 + 3i$, $1 + i$.
- L'équation $4z^2 - 2z + 1 = 0$ a pour solutions : $\frac{1}{4}(1 + i\sqrt{3})$, $\frac{1}{4}(1 - i\sqrt{3})$.
- L'équation $z^4 + 10z^2 + 169 = 0$ a pour solutions : $2 + 3i$, $-2 - 3i$, $2 - 3i$, $-2 + 3i$.
- L'équation $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$ a pour solutions : $\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i\sqrt{3})$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i\sqrt{3})$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i\sqrt{3})$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i\sqrt{3})$.

Correction de l'exercice 8 ▲

$$S_n = 1 + z + z^2 + \dots + z^n = \sum_{k=0}^n z^k.$$

Nous devons retrouver le résultat sur la somme $S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$ d'une suite géométrique dans le cas où $z \neq 1$ est un réel. Soit maintenant $z \neq 1$ un nombre complexe. Calculons $S_n(1 - z)$.

$$\begin{aligned} S_n(1 - z) &= (1 + z + z^2 + \dots + z^n)(1 - z) \text{ développons} \\ &= 1 + z + z^2 + \dots + z^n - z - z^2 - \dots - z^{n+1} \text{ les termes intermédiaires s'annulent} \\ &= 1 - z^{n+1}. \end{aligned}$$

Donc

$$S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, \text{ pour } z \neq 1.$$

Correction de l'exercice 9 ▲

Calcul de racine n -ième. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = 1$, déjà $|z|^n = 1$ et donc $|z| = 1$. Écrivons $z = e^{i\theta}$. L'équation devient

$$e^{in\theta} = e^0 = 1 \Leftrightarrow n\theta = 0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \theta = \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}.$$

Les solutions sont donc

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Comme le polynôme $z^n - 1$ est de degré n il a au plus n racines. Nous choisissons pour représentants :

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k = 0, \dots, n-1 \right\}.$$

De plus si $\varepsilon = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ alors $\mathcal{S} = \{\varepsilon^k, k = 0, \dots, n-1\}$. Ces racines sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k = \frac{1-z^n}{1-z}$ pour $z \neq 1$. Donc quelque soit $z \in \mathcal{S} \setminus \{1\}$ $P(z) = 0$, nous avons ainsi trouvé $n-1$ racines pour P de degré $n-1$, donc l'ensemble des racines de P est exactement $\mathcal{S} \setminus \{1\}$.

Pour conclure soit $Q_p(z) = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon^{kp}$.

Si $p = 0 + \ell n$, $\ell \in \mathbb{Z}$ alors $\varepsilon^{kp} = \varepsilon^{k\ell n} = (\varepsilon^n)^{k\ell} = 1^{k\ell} = 1$. Donc $Q_p(z) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 = n$.

Si non $Q_p(z)$ est la somme d'une suite géométrique de raison ε^p :

$$Q_p(z) = \frac{1 - (\varepsilon^p)^n}{1 - \varepsilon^p} = \frac{1 - (\varepsilon^n)^p}{1 - \varepsilon^p} = \frac{1 - 1}{1 - \varepsilon^p} = 0.$$

Correction de l'exercice 10 ▲

- Les trois racines cubiques ont même module $\sqrt[3]{2}$, et leurs arguments sont $-\pi/12$, $7\pi/12$ et $5\pi/4$. Des valeurs approchées sont $1,36603 - 0,36603i$, $-0,36603 + 1,36603i$ et $-1 - i$.
- $-1 - 2i$, $(-1 - 2i)j$ et $(-1 - 2i)j^2$ où $j = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ (racine cubique de 1).

Correction de l'exercice 11 ▲

Soient z_1, z_2, z_3 trois nombres complexes *distincts* ayant le même cube.

- $z_1 \neq 0$ car sinon on aurait $z_1 = z_2 = z_3 = 0$. Ainsi $(\frac{z_2}{z_1})^3 = (\frac{z_3}{z_1})^3 = 1$. Comme les trois nombres $1, (\frac{z_2}{z_1})$ et $(\frac{z_3}{z_1})$ sont distincts on en déduit que ce sont les trois racines cubiques de 1. Ces racines sont $1, j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ et $j^2 = e^{-\frac{2i\pi}{3}}$. A une permutation près des indices 2 et 3 on a donc :

$$z_2 = jz_1 \quad \text{et} \quad z_3 = j^2z_1.$$

- Soit $z \in \mathbb{C}$. On a les équivalences suivantes :

$$z^6 + (7-i)z^3 - 8 - 8i = 0 \Leftrightarrow z^3 \text{ est solution de } Z^2 + (7-i)Z - 8 - 8i = 0$$

Étudions l'équation $Z^2 + (7-i)Z - 8 - 8i = 0$. $\Delta = (7-i)^2 + 4(8+8i) = 80 + 18i = (9+i)^2$. Les solutions sont donc -8 et $1+i$. Nous pouvons reprendre notre suite d'équivalences :

$$\begin{aligned} z^6 + (7-i)z^3 - 8 - 8i = 0 &\Leftrightarrow z^3 \in \{-8, 1+i\} \\ &\Leftrightarrow z^3 = (-2)^3 \quad \text{ou} \quad z^3 = (\sqrt[6]{2}e^{i\frac{\pi}{12}})^3 \\ &\Leftrightarrow z \in \{-2, -2e^{\frac{2i\pi}{3}}, -2e^{-\frac{2i\pi}{3}}\} \quad \text{ou} \quad z \in \{\sqrt[6]{2}e^{i\frac{\pi}{12}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{9\pi}{12}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{17\pi}{12}}\} \\ &\Leftrightarrow z \in \{-2, 2e^{\frac{i\pi}{3}}, 2e^{-\frac{i\pi}{3}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{\pi}{12}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{17\pi}{12}}\}. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\{-2, 2e^{\frac{i\pi}{3}}, 2e^{-\frac{i\pi}{3}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{\pi}{12}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}, \sqrt[6]{2}e^{i\frac{17\pi}{12}}\}.$$

Correction de l'exercice 12 ▲

Nous identifions \mathbb{C} au plan affine et $z = x + iy$ à $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Remarquons que pour les deux ensembles $z = 5$ n'est pas solution, donc

$$\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = 1 \Leftrightarrow |z-3| = |z-5|.$$

Ce qui signifie précisément que les points d'affixe z sont situés à égale distance des points A, B d'affixes respectives $3 = (3, 0)$ et $5 = (5, 0)$. L'ensemble solution est la médiatrice du segment $[A, B]$.

Ensuite pour

$$\begin{aligned} \left| \frac{z-3}{z-5} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} &\Leftrightarrow |z-3|^2 = \frac{1}{2}|z-5|^2 \\ &\Leftrightarrow (z-3)\overline{(z-3)} = \frac{1}{2}(z-5)\overline{(z-5)} \\ &\Leftrightarrow z\bar{z} - (z+\bar{z}) = 7 \\ &\Leftrightarrow |z-1|^2 = 8 \\ &\Leftrightarrow |z-1| = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

L'ensemble solution est donc le cercle de centre le point d'affixe $1 = (1, 0)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

Correction de l'exercice 13 ▲

$$|u+v|^2 + |u-v|^2 = (u+v)(\bar{u}+\bar{v}) + (u-v)(\bar{u}-\bar{v}) = 2u\bar{u} + 2v\bar{v} = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

Géométriquement il s'agit de l'identité du parallélogramme. Les points d'affixes $0, u, v, u+v$ forment un parallélogramme. $|u|$ et $|v|$ sont les longueurs des cotés, et $|u+v|, |u-v|$ sont les longueurs des diagonales. Il n'est pas évident de montrer ceci sans les nombres complexes !!

Correction de l'exercice 14 ▲

- Comme (A_0, \dots, A_4) est un pentagone régulier, on a $OA_0 = OA_1 = OA_2 = OA_3 = OA_4 = 1$ et $(\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_1}) = \frac{2\pi}{5}[2\pi], (\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_2}) = \frac{4\pi}{5}[2\pi], (\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_3}) = -\frac{4\pi}{5}[2\pi], (\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_4}) = -\frac{2\pi}{5}[2\pi]$. On en déduit: $\omega_0 = 1, \omega_1 = e^{\frac{2i\pi}{5}}, \omega_2 = e^{\frac{4i\pi}{5}}, \omega_3 = e^{-\frac{4i\pi}{5}} = e^{\frac{6i\pi}{5}}, \omega_4 = e^{-\frac{2i\pi}{5}} = e^{\frac{8i\pi}{5}}$. On a bien $\omega_i = \omega_i^j$. Enfin, comme $\omega_1 \neq 0$, $1 + \omega_1 + \dots + \omega_1^4 = \frac{1-\omega_1^5}{1-\omega_1} = \frac{1-1}{1-\omega_1} = 0$.
- $\operatorname{Re}(1 + \omega_1 + \dots + \omega_1^4) = 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{5}) + 2\cos(\frac{4\pi}{5})$. Comme $\cos(\frac{4\pi}{5}) = 2\cos^2(\frac{2\pi}{5}) - 1$ on en déduit: $4\cos^2(\frac{2\pi}{5}) + 2\cos(\frac{2\pi}{5}) - 1 = 0$. $\cos(\frac{2\pi}{5})$ est donc bien une solution de l'équation $4z^2 + 2z - 1 = 0$. Etudions cette équation: $\Delta = 20 = 2^2 \cdot 5$. Les solutions sont donc $\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$ et $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$. Comme $\cos(\frac{2\pi}{5}) > 0$, on en déduit que $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
- $BA_2^2 = |\omega_2 + 1|^2 = |\cos(\frac{4\pi}{5}) + i\sin(\frac{4\pi}{5}) + 1|^2 = 1 + 2\cos(\frac{4\pi}{5}) + \cos^2(\frac{4\pi}{5}) + \sin^2(\frac{4\pi}{5}) = 4\cos^2(\frac{2\pi}{5})$. Donc $BA_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
- $BI = |i/2 + 1| = \frac{\sqrt{5}}{2}$. $BJ = BI - 1/2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
- Pour tracer un pentagone régulier, on commence par tracer un cercle C_1 et deux diamètres orthogonaux, qui jouent le rôle du cercle passant par les sommets et des axes de coordonnées. On trace ensuite le milieu d'un des rayons: on obtient le point I de la question 4. On trace le cercle de centre I passant par

le centre de C_1 : c'est le cercle \mathcal{C} . On trace le segment BI pour obtenir son point J d'intersection avec \mathcal{C} . On trace enfin le cercle de centre B passant par J : il coupe C_1 en A_2 et A_3 , deux sommets du pentagone. Il suffit pour obtenir tous les sommets de reporter la distance A_2A_3 sur C_1 , une fois depuis A_2 , une fois depuis A_3 . (en fait le cercle de centre B et passant par J' , le point de \mathcal{C} diamétralement opposé à J , coupe C_1 en A_1 et A_4 , mais nous ne l'avons pas justifié par le calcul : c'est un exercice !)

Correction de l'exercice 15 ▲

Écrivons $z = \rho e^{i\theta}$, alors $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$. Donc

$$\begin{aligned} P &= \prod_{k=1}^n (z^k + \bar{z}^k) \\ &= \prod_{k=1}^n \rho^k ((e^{i\theta})^k + (e^{-i\theta})^k) \\ &= \prod_{k=1}^n \rho^k (e^{ik\theta} + e^{-ik\theta}) \\ &= \prod_{k=1}^n 2\rho^k \cos k\theta \\ &= 2^n \cdot \rho \cdot \rho^2 \cdot \dots \cdot \rho^n \prod_{k=1}^n \cos k\theta \\ &= 2^n \rho^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{k=1}^n \cos k\theta. \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 16 ▲

Nous avons par la formule de Moivre

$$\cos 5\theta + i \sin 5\theta = e^{i5\theta} = (e^{i\theta})^5 = (\cos \theta + i \sin \theta)^5.$$

On développe ce dernier produit, puis on identifie parties réelles et parties imaginaires. On obtient :

$$\begin{aligned} \cos 5\theta &= \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta \\ \sin 5\theta &= 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta \end{aligned}$$

Remarque : Grâce à la formule $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, on pourrait continuer les calculs et exprimer $\cos 5\theta$ en fonction de $\cos \theta$, et $\sin 5\theta$ en fonction de $\sin \theta$.

Correction de l'exercice 17 ▲

1. Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$. Notons $\alpha = a + ib$ et $\beta = c + id$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Alors $\alpha + \beta = (a + c) + i(b + d)$ et $a + c \in \mathbb{Z}$, $b + d \in \mathbb{Z}$ donc $\alpha + \beta \in \mathbb{Z}[i]$. De même, $\alpha\beta = (ac - bd) + i(ad + bc)$ et $ac - bd \in \mathbb{Z}$, $ad + bc \in \mathbb{Z}$ donc $\alpha\beta \in \mathbb{Z}[i]$.
2. Soit $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ inversible. Il existe donc $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $\alpha\beta = 1$. Ainsi, $\alpha \neq 0$ et $\frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Z}[i]$. Remarquons que tout élément non nul de $\mathbb{Z}[i]$ est de module supérieur ou égal à 1: en effet $\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| \geq \sup(|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|)$ et si $z \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$, $\sup(|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|) \geq 1$. Si $|\alpha| \neq 1$ alors $|\alpha| > 1$ et $|1/\alpha| < 1$. On en déduit $1/\alpha = 0$ ce qui est impossible. Ainsi $|\alpha| = 1$, ce qui implique $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$.

Réciproquement, $1^{-1} = 1 \in \mathbb{Z}[i]$, $(-1)^{-1} = -1 \in \mathbb{Z}[i]$, $i^{-1} = -i \in \mathbb{Z}[i]$, $(-i)^{-1} = i \in \mathbb{Z}[i]$. Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont donc $1, -1, i$ et $-i$.

3. Soit $\omega \in \mathbb{C}$. Notons $\omega = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. soit $E(x)$ la partie entière de x , i.e. le plus grand entier inférieur ou égal à x : $E(x) \leq x < E(x) + 1$. Si $x \leq E(x) + 1/2$, notons $n_x = E(x)$, et si $x > E(x) + 1/2$, notons $n_x = E(x) + 1$. n_x est le, ou l'un des s'il y en a deux, nombre entier le plus proche de x : $|x - n_x| \leq 1/2$. Notons n_y l'entier associé de la même manière à y . Soit alors $\alpha = n_x + i \cdot n_y$. $z \in \mathbb{Z}[i]$ et $|\omega - \alpha|^2 = (x - n_x)^2 + (y - n_y)^2 \leq 1/4 + 1/4 = 1/2$. Donc $|\omega - \alpha| < 1$.
4. Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, avec $\beta \neq 0$. Soit alors $q \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|\frac{\alpha}{\beta} - q| < 1$. Soit $r = \alpha - \beta q$. Comme $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ et $\beta q \in \mathbb{Z}[i]$, $r \in \mathbb{Z}[i]$. De plus $|\frac{r}{\beta}| = |\frac{\alpha}{\beta} - q| < 1$ donc $|r| < |\beta|$.
-