Énoncés : V. Gritsenko
Corrections : J.-F. Barraud

Anneaux et idéaux

Exercice 1

Donner la définition d'un corps. Les opérations binaires $+$ et $\cdot$, sont-elles équivalentes dans la définition ?

Correction ▼ [002249]

Exercice 2

Trouver toutes les solutions des équations :

1. $ax+b=c$ $(a,b,c\in K, K$ est un corps$)$;
2. $2x\equiv 3 \mod 10$ et $2x\equiv 6 \mod 10$ dans l'anneau $\mathbb{Z}_{10}=\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

Correction ▼ [002250]

Exercice 3

Soit A un anneau. Démontrer que :

1. $\forall a\in A \;\; 0_A\cdot a=0_A$;
2. $(-1_A)\cdot a=-a$;
3. $|A|\geqslant 2 \iff 1_A\neq 0_A$ dans A.

Correction ▼ [002251]

Exercice 4

1. Si $x\cdot y$ est inversible dans un anneau A, alors x et y sont inversibles.
2. Dans un anneau, un élément inversible n'est pas diviseur de zéro et un diviseur de zéro n'est pas inversible.

Correction ▼ [002252]

Exercice 5

Démontrer que tout anneau intègre fini est un corps.

Indication ▼ Correction ▼ [002253]

Exercice 6

Lesquels de ces sous-ensembles donnés de $\mathbb{C}$ sont des anneaux ? Lesquels sont des corps ?

1. $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} 10^{-n}\mathbb{Z}$;
2. $\{\frac{m}{n} \mid m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}^*, (m,n)=1, p\nmid n\}$ (p est un nombre premier fixé) ;
3. $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sqrt{-1}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sqrt{2}$;
4. $\mathbb{Q}[\sqrt{-1}]=\mathbb{Q}+\mathbb{Q}\sqrt{-1}$, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]=\mathbb{Q}+\mathbb{Q}\sqrt{2}$.

Correction ▼ [002254]

Exercice 7

Les éléments inversibles d'un anneau A forment le groupe multiplicatif $(A^\times, \cdot)$.

1. Trouver $A^\times$ pour les anneaux 1. et 2. de l'exercice 6.
2. Trouver le groupe $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$ en utilisant la norme complexe.
3. Montrer que le groupe $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.

[002255]

Exercice 8

Un élément a d'un anneau A s'appelle nilpotent, s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = 0$. Trouver tous les éléments inversibles, les diviseurs de zéro, les nilpotents des anneaux suivants :

1. $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$;
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;
3. Démontrer que, pour tout nilpotent x de A, l'élément $1+x$ est inversible.

[002256]

Exercice 9

Soit I un idéal d'un anneau A. On note par $(a) = a \cdot A$ l'idéal principal engendré par a. Montrer que :

1. $I = A$ si et seulement si I contient une unité;
2. $(a) = A$ ssi a est inversible;
3. Un anneau A est un corps ssi (0) est le seul idéal propre de A.

[002257]

Exercice 10

Montrer que les éléments nilpotents d'un anneau forment un idéal. [002258]

Exercice 11 Sommes et produits d'idéaux

1. Soient I, J deux idéaux d'un anneau A. Montrer que
$$I \cap J, \qquad I + J = \{x + y \,|\, x \in I, y \in J\}$$
sont des idéaux de A.
2. Montrer que $I + J$ est le plus petit idéal de A contenant I et J.
3. Soit $n, m \in \mathbb{Z}$, $I = (n) = n\mathbb{Z}$, $J = (m) = m\mathbb{Z}$. Trouver $I \cap J$ et $I + J$.
4. Montrer que
$$I \cdot J = \{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots x_n y_n \,|\, n \in \mathbb{N},\ x_k \in I,\ y_k \in J \text{ pour } 1 \leqslant k \leqslant n\}$$
est un idéal. Il s'appelle *produit des idéaux* I et J.
5. On considère les idéaux $I = (x_1, \ldots x_n) = Ax_1 + \cdots + Ax_n$ et $J = (y_1, \ldots y_m) = Ay_1 + \cdots + Ay_m$. Décrire les idéaux $I + J$, $I \cdot J$, I^2 en fonction de x_k, y_l.

[002259]

Exercice 12 Idéaux étrangers

1. Montrer que $I \cdot J \subset I \cap J$ et $(I+J) \cdot (I \cap J) \subset I \cdot J$
2. On dit que deux idéaux I et J de A sont *étrangers* si $I+J=A$. Montrer que $I \cap J = I \cdot J$ si I, J sont étrangers.

[002260]

Indication pour l'exercice 5 ▲

Voir la solution de l'exercice **??**, deuxième question.

Correction de l'exercice 1 ▲

Cours... Non, les rôles des deux opérations ne sont pas interchangeables, puisque l'une est distributive sur l'autre.

Correction de l'exercice 2 ▲

1. une seule solution $x = a^{-1}(c-b)$
2. pas de solution, et deux solutions. Attention, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, on ne peut pas inverser 2. Ecrire $2x = 3+10k$ pour obtenir que $2|3$, et $2x = 6+10k$ pour simplifier par 2... dans $\mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 3 ▲

1. Ecrire $(0+a)a = a.a$ d'une part (0 est neutre pour $+$) et $(0+a).a = 0.a+a.a$ (distributivité).
2. $(-1).a+a = (-1+1).a = 0.a = 0$ (distributivité, puis question précédente)
3. Si $|A| = 1$, $1 = 0$. Si $1 = 0$, $\forall a \in A, a = 1.a = 0.a = 0$, donc $A = \{0\}$.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. Si $xy \in A^\times$, soit $z \in A, (xy)z = 1$. Alors $x(yz) = 1$ et $(zx)y = 1$ donc x et y sont inversibles.
2. Soit $x \in A^\times$, et $y \in A, xy = 0$. Alors $x^{-1}xy = y = 0$. Donc x n'est pas diviseur de 0.

Correction de l'exercice 5 ▲

Soit $a \in A \setminus \{0\}$. Soit $\phi_a : A \to A, x \mapsto ax$. Si $\phi_a(x) = \phi_a(y)$, alors $ax = ay$. Mais $ax = ay$ ssi $a(x-y) = 0$, or $a \neq 0$ et A est intègre, donc $x = y$. Ainsi ϕ_a est injective de A dans A. Comme A est fini, elle est donc aussi surjective : $\exists x \in A, \phi_a(x) = 1$.

Correction de l'exercice 6 ▲

Ce sont tous des anneaux. Montrer que A est stable par addition, par passage à l'opposé, contient 0, est stable par multiplication et contient 1. Le reste (associativité et distributivité) est automatique puisqu'il s'agit des restrictions des opérations usuelles sur $\mathbb{C}$)

1. A est l'ensemble des nombres dont le développement décimal s'arrête ("nombre fini de chiffres après la virgule").

   Stabilité par addition : Soit $x = 10^{-n}a$ et $y = 10^{-m}b$. Supposons par exemple que $n \geqslant m$. Alors $x+y = 10^{-n}(a+10^{n-m}b)$ et $a+10^{n-m}b \in \mathbb{Z}$ donc $x+y \in A$. Les autres vérifications sont analogues.

   Ce n'est pas un corps : 3 n'est pas inversible, puisque si $3 \cdot 10^{-n}a = 1$, alors $3a = 10^n$ donc $3|10^n$ ce qui est impossible. Un élément est inversible ssi il est de la forme $10^{-n}2^\alpha 5^\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$.

2. Stabilité par addition : Soit $x = \frac{a}{b} \in A$ et $y = \frac{c}{d} \in A$, avec $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(c,d) = \text{pgcd}(p,b) = \text{pgcd}(p,d) = 1$. Alors $x+y = \frac{ad+bc}{bd}$.

   Ce n'est pas un corps : p n'est pas inversible. Un élément est inversible ssi ce n'est pas un multiple de p.

3. N'est pas un corps : 2 n'est pas inversible. Les seuls éléments inversibles sont $1, -1, i, -i$. En effet, si $z \in A^\times$, alors $|z| \geqslant 1$ et $|z^{-1}| \geqslant 1$. Donc $|z| = 1$ et $z \in \{\pm 1, \pm i\}$. Réciproquement, ces éléments sont bien tous inversibles.