Séries

Exercices de Jean-Louis Rouget. Retrouver aussi cette fiche sur www.maths-france.fr

* très facile ** facile *** difficulté moyenne **** difficile ***** très difficile
I : Incontournable

Exercice 1

Nature de la série de terme général

1) (*) $\ln\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)$ **2)** (*) $\frac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$ **3)** (**) $\left(\frac{n+3}{2n+1}\right)^{\ln n}$ **4)** (**) $\frac{1}{\ln(n)\ln(\mathrm{ch}\, n)}$
5) (**) $\arccos\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^2}}$ **6)** (*) $\frac{n^2}{(n-1)!}$ **7)** $\left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n-\frac{1}{\sqrt{e}}$ **8)** (**) $\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan\frac{n^2+1}{n}\right)$
9) (*) $\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 x}{n^2+\cos^2 x}\,dx$ **10)** (**) $n^{-\sqrt{2}\sin(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})}$ **11)** (**) $e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Correction ▼ [005688]

Exercice 2

Nature de la série de terme général
1) (***) $\sqrt[4]{n^4+2n^2}-\sqrt[3]{P(n)}$ où P est un polynôme. **2)** (**) $\frac{1}{n^\alpha}S(n)$ où $S(n)=\sum_{p=2}^{+\infty}\frac{1}{p^n}$.
3) (**) u_n où $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $u_n=\frac{1}{n}e^{-u_{n-1}}$.
4) (****) $u_n=\frac{1}{p_n}$ où p_n est le n-ème nombre premier
(indication : considérer $\sum_{n=1}^N\ln\left(\frac{1}{1-\frac{1}{p_n}}\right)=\sum_{n=1}^N\ln(1+p_n+p_n^2+\ldots)$).
5) (***) $u_n=\frac{1}{n(c(n))^\alpha}$ où $c(n)$ est le nombre de chiffres de n en base 10.
6) (*) $\frac{(\prod_{k=2}^n\ln k)^a}{(n!)^b}$ $a>0$ et $b>0$. **7)** (**) $\arctan\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^a\right)-\arctan\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^a\right)$.
8) (**) $\frac{1}{n^\alpha}\sum_{k=1}^n k^{3/2}$. **9)** (***) $\left(\prod_{k=1}^n\left(1+\frac{k}{n^\alpha}\right)\right)-1$.

Correction ▼ [005689]

Exercice 3

Nature de la série de terme général
1) (***) $\sin\left(\frac{\pi n^2}{n+1}\right)$ **2)** (**) $\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{n-1}}$ **3)** (**) $\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ **4)** (***) $\frac{e^{in\alpha}}{n}$, $\frac{\cos(n\alpha)}{n}$ et $\frac{\sin(n\alpha)}{n}$
5) (**) $(-1)^n\frac{\ln n}{n}$
$(-1)^n\frac{P(n)}{Q(n)}$ où P et Q sont deux polynômes non nuls
7) (****) $(\sin(n!\pi e))^p$ p entier naturel non nul.

Correction ▼ [005690]

Exercice 4

Calculer les sommes des séries suivantes après avoir vérifié leur convergence.

1) (**) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n+1}{3^n}$ **2)** (**) $\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{2n-1}{n^3-4n}$ **3)** (***) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(3n)!}$
4) (*) $\sum_{n=2}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n-1}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{2}{\sqrt{n}}\right)$ **5)** (**) $\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)$ **6)** (***) $\sum_{n=0}^{+\infty}\ln\left(\cos\frac{a}{2^n}\right)$ $a\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$
textbf7) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\mathrm{th}\,\frac{a}{2^n}}{2^n}$

Correction ▼ [005691]

Exercice 5 *** I

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de nombres réels strictement positifs telle que la série de terme général u_n converge. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$. Trouver un exemple de suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels strictement positifs telle que la série de terme général u_n converge mais telle que la suite de terme général nu_n ne tende pas vers 0.

Correction ▼ [005692]

Exercice 6 ***

Soit σ une injection de $\mathbb{N}^*$ dans lui-même. Montrer que la série de terme général $\frac{\sigma(n)}{n^2}$ diverge.

Correction ▼ [005693]

Exercice 7 **

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. Montrer que les séries de termes généraux u_n, $\frac{u_n}{1+u_n}$, $\ln(1+u_n)$ et $\int_0^{u_n}\frac{dx}{1+x^e}$ sont de mêmes natures.

Correction ▼ [005694]

Exercice 8 ***

Trouver un développement limité à l'ordre 4 quand n tend vers l'infini de $\left(e-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\right)\times(n+1)!$.

Correction ▼ [005695]

Exercice 9 ***

Nature de la série de terme général $u_n = \sin\left(\pi(2+\sqrt{3})^n\right)$.

Correction ▼ [005696]

Exercice 10 **

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive telle que la série de terme général u_n converge. Etudier la nature de la série de terme général $\frac{\sqrt{u_n}}{n}$.

Correction ▼ [005697]

Exercice 11 ***

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. Trouver la nature de la série de terme général $v_n = \frac{u_n}{(1+u_1)\dots(1+u_n)}$, $n\geqslant 1$, connaissant la nature de la série de terme général u_n puis en calculer la somme en cas de convergence.

Correction ▼ [005698]

Exercice 12 ****

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs telle que la série de terme général u_n diverge.
Pour $n\in\mathbb{N}$, on pose $S_n = u_0+\dots+u_n$. Etudier en fonction de $\alpha>0$ la nature de la série de terme général $\frac{u_n}{(S_n)^\alpha}$.

Correction ▼ [005699]

Exercice 13 **

Soit $\alpha\in\mathbb{R}$. Nature de la série de terme général $u_n = \frac{1+(-1)^n n^\alpha}{n^{2\alpha}}$, $n\geqslant 1$.

Correction ▼ [005700]

Exercice 14 ****

On sait que $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\dots = \ln 2$.
A partir de la série précédente, on construit une nouvelle série en prenant p termes positifs, q termes négatifs, p termes positifs ... (Par exemple pour $p=3$ et $q=2$, on s'intéresse à $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\dots$).

Convergence et somme de cette série.

Correction ▼ [005701]

Exercice 15 ***

Nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k(n-k))^\alpha}$.

Correction ▼ [005702]

Exercice 16

Convergence et somme éventuelle de la série de terme général

1) (**) $u_n = \frac{2n^3-3n^2+1}{(n+3)!}$ **2)** (***) $u_n = \frac{n!}{(a+1)(a+2)\dots(a+n)}$, $n \geqslant 1$, $a \in \mathbb{R}^{+*}$ donné.

Correction ▼ [005703]

Exercice 17 *

Nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(n+k)^p}$, $p \in]0,+\infty[$.

Correction ▼ [005704]

Exercice 18 **

Déterminer un équivalent simple de $\frac{n!}{(a+1)(a+2)\dots(a+n)}$ quand n tend vers l'infini (a réel positif donné).

Correction ▼ [005705]

Exercice 19 *

Nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(n+k)^p}$, $p \in]0,+\infty[$.

Correction ▼ [005706]

Exercice 20 *** I

Développement limité à l'ordre 4 de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ quand n tend vers l'infini.

Correction ▼ [005707]

Exercice 21

Partie principale quand n tend vers $+\infty$ de

1) (***) $\sum_{p=n+1}^{+\infty} (-1)^p \frac{\ln p}{p}$ **2)** (**) $\sum_{p=1}^{n} p^p$.

Correction ▼ [005708]

Exercice 22 ***

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{p\in\mathbb{N}^*} \left(\sum_{n\in\mathbb{N}^*,\, n\neq p} \frac{1}{n^2-p^2}\right)$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \left(\sum_{p\in\mathbb{N}^*,\, p\neq n} \frac{1}{n^2-p^2}\right)$. Que peut-on en déduire ?

Correction ▼ [005709]

Exercice 23 **

Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

Correction ▼ [005710]

Exercice 24 ****

Soient $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. Pour $n \geqslant 1$, on pose $v_n = \frac{u_1+\dots+u_n}{n}$. Montrer que si la série de terme général $(u_n)^2$ converge alors la série de terme général $(v_n)^2$ converge et que $\sum_{n=1}^{+\infty} (v_n)^2 \leqslant 4\sum_{n=1}^{+\infty} (u_n)^2$ (indication : majorer $v_n^2 - 2u_n v_n$).

Correction ▼ [005711]

Exercice 25 ***

Convergence et somme de la série de terme général $u_n = \frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}$, $n \geqslant 0$.

Correction ▼ [005712]

Correction de l'exercice 1 ▲

1. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)$. $\forall n \geqslant 1$, u_n existe

$$u_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right) - \ln\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \left(\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - \left(\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Comme la série de terme général $\frac{1}{n^2}$, $n \geqslant 1$, converge (série de RIEMANN d'exposant $\alpha > 1$), la série de terme général u_n converge.

2. Pour $n \geqslant 2$, on pose $u_n = \frac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$. $\forall n \geqslant 2$, u_n existe et de plus $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Comme la série de terme général $\frac{1}{n}$, $n \geqslant 2$, diverge et est positive, la série de terme général u_n diverge.

3. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \left(\frac{n+3}{2n+1}\right)^{\ln n}$. Pour $n \geqslant 1$, $u_n > 0$ et

$$\begin{aligned}\ln(u_n) &= \ln(n)\ln\left(\frac{n+3}{2n+1}\right) = \ln(n)\left(\ln\left(\frac{1}{2}\right)+\ln\left(1+\frac{3}{n}\right)-\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{=} \ln(n)\left(-\ln 2+O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{=} -\ln 2\ln(n)+o(1).\end{aligned}$$

Donc $u_n = e^{\ln(u_n)} \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{-\ln 2\ln n} = \frac{1}{n^{\ln 2}}$. Comme la série de terme général $\frac{1}{n^{\ln 2}}$, $n \geqslant 1$, diverge (série de RIEMANN d'exposant $\alpha \leqslant 1$) et est positive, la série de terme général u_n diverge.

4. Pour $n \geqslant 2$, on pose $u_n = \frac{1}{\ln(n)\ln(\mathrm{ch}\, n)}$. u_n existe pour $n \geqslant 2$. $\ln(\mathrm{ch}\, n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln\left(\frac{e^n}{2}\right) = n - \ln 2 \underset{n\to+\infty}{\sim} n$ et $un \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n\ln(n)} > 0$.

Vérifions alors que la série de terme général $\frac{1}{n\ln n}$, $n \geqslant 2$, diverge. La fonction $x \to x\ln x$ est continue, croissante et strictement positive sur $]1,+\infty[$ (produit de deux fonctions strictement positives et croissantes sur $]1,+\infty[$). Par suite, la fonction $x \to \frac{1}{x\ln x}$ est continue et décroissante sur $]1,+\infty[$ et pour tout entier k supérieur ou égal à 2,

$$\frac{1}{k\ln k} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{x\ln x}\,dx$$

Par suite, pour $n \geqslant 2$,

$$\sum_{k=2}^n \frac{k\ln k}{\geqslant} \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x\ln x}\,dx = \int_2^{n+1} \frac{1}{x\ln x}\,dx = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2) \underset{n\to+\infty}{\to} +\infty.$$

Donc u_n est positif et équivalent au terme général d'une série divergente. La série de terme général u_n diverge.

5. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \arccos\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^2}}$. u_n existe pour $n \geqslant 1$. De plus $u_n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$. On en déduit que

$$\begin{aligned}u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sin(u_n) &= \sin\left(\arccos\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^2}}\right) = \sqrt{1-\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{2/3}} \underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{1-1+\frac{2}{3n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)}\\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{3}}\frac{1}{n} > 0\end{aligned}$$

terme général d'une série de RIEMANN divergente. La série de terme général un diverge.

6. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \frac{n^2}{(n-1)!}$. u_n existe et $u_n \neq 0$ pour $n \geqslant 1$. De plus,

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{(n+1)^2}{n^2} \times \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{(n+1)^2}{n^3} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\to} 0 < 1.$$

D'après la règle de d'ALEMBERT, la série de terme général u_n converge.

7. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{e}}$. u_n est défini pour $n \geqslant 1$ car pour $n \geqslant 1$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et donc $\cos\frac{1}{\sqrt{n}} > 0$. Ensuite

$$\begin{aligned}\ln\left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right) &\underset{n\to+\infty}{=} \ln\left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{2n} + \frac{1}{24n^2} - \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

Puis $n\ln\left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{2} - \frac{1}{12n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et donc

$$u_n = e^{n\ln(\cos(1/\sqrt{n})} - \frac{1}{\sqrt{e}} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{e}}\left(e^{-\frac{1}{12n}+o\left(\frac{1}{n}\right)} - 1\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{12n\sqrt{e}} < 0.$$

La série de terme général $-\frac{1}{12n\sqrt{e}}$ est divergente et donc la série de terme général u_n diverge.

8.

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan\left(\frac{n^2+1}{n}\right)\right) &= \ln\left(1 - \frac{2}{\pi}\arctan\left(\frac{n}{n^2+1}\right)\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{2}{\pi}\arctan\left(\frac{n}{n^2+1}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{2}{\pi}\frac{n}{n^2+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{2}{n\pi} < 0.\end{aligned}$$

Donc, la série de terme général u_n diverge.

9. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x}{n^2+\cos^2 x}\,dx$.

   Pour $n \geqslant 1$, la fonction $x \mapsto \frac{\cos^2 x}{n^2+\cos^2 x}\,dx$ est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et positive et donc, u_n existe et est positif. De plus, pour $n \geqslant 1$,

$$0 \leqslant u_n \leqslant \int_0^{\pi/2} \frac{1}{n^2+0}\,dx = \frac{\pi}{2n^2}.$$

   La série de terme général $\frac{\pi}{2n^2}$ converge et donc la série de terme général u_n converge.

10. $-\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right) = -\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} -1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$ puis

$$-\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)\ln n \underset{n\to+\infty}{=} -\ln(n) + O\left(\frac{\ln n}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} -\ln(n) + o(1).$$

   Par suite,

$$0 < u_n = e^{-\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)\ln n} \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{-\ln n} = \frac{1}{n}.$$

   La série de terme général $\frac{1}{n}$ diverge et la série de terme général u_n diverge.

11. $n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et donc

$$u_n \underset{n\to+\infty}{=} e - e^{1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{n\to+\infty}{=} e\left(1 - 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{e}{2n} > 0.$$

La série de terme général $\frac{e}{2n}$ diverge et la série de terme général u_n diverge.

Correction de l'exercice 2 ▲

1. Si P n'est pas unitaire de degré 3, u_n ne tend pas vers 0 et la série de terme général u_n diverge grossièrement.
   Soit P un polynôme unitaire de degré 3. Posons $P = X^3 + aX^2 + bX + c$.

$$\begin{aligned} u_n &= n\left(\left(1+\frac{2}{n^2}\right)^{1/4} - \left(1+\frac{a}{n}+\frac{b}{n^2}+\frac{c}{n^3}\right)^{1/3}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} n\left(\left(1+\frac{1}{2n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - \left(1+\frac{a}{3n}+\frac{b}{3n^2}-\frac{a^2}{9n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} -\frac{a}{3}+\left(\frac{1}{2}-\frac{b}{3}+\frac{a^2}{9}\right)\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

   • Si $a \neq 0$, u_n ne tend pas vers 0 et la série de terme général u_n diverge grossièrement.
   • Si $a = 0$ et $\frac{1}{2} - \frac{b}{3} \neq 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \left(\frac{1}{2}-\frac{b}{3}\right)\frac{1}{n}$. u_n est donc de signe constant pour n grand et est équivalent au terme général d'une série divergente. Donc la série de terme général u_n diverge.
   • Si $a = 0$ et $\frac{1}{2} - \frac{b}{3} = 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Dans ce cas, la série de terme général u_n converge (absolument).

   En résumé, la série de terme général u_n converge si et seulement si $a = 0$ et $b = \frac{3}{2}$ ou encore la série de terme général u_n converge si et seulement si P est de la forme $X^3 + \frac{3}{2}X + c$, $c \in \mathbb{R}$.

2. Pour $n \geqslant 2$, posons $u_n = \frac{1}{n^\alpha}S(n)$. Pour $n \geqslant 2$,

$$0 < S(n+1) = \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p} \times \frac{1}{p^n} \leqslant \frac{1}{2}\sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p^n} = \frac{1}{2}S(n)$$

   et donc $\forall n \geqslant 2$, $S(n) \leqslant \frac{S(2)}{2^{n-2}}$. Par suite,

$$u_n \leqslant \frac{1}{n^\alpha}\frac{S(2)}{2^{n-2}} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

   Pour tout réel α, la série de terme général u_n converge.

3. $\forall u_0 \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$. Par suite, $\forall n \geqslant 2$, $0 < u_n < \frac{1}{n}$.
   On en déduit que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ et par suite $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n} > 0$. La série de terme général u_n diverge.

4. On sait qu'il existe une infinité de nombres premiers.
   Notons $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite croissante des nombres premiers. La suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite strictement croissante d'entiers et donc $\lim_{n\to+\infty} p_n = +\infty$ ou encore $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{p_n} = 0$.
   Par suite, $0 < \frac{1}{p_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln\left(\left(1-\frac{1}{p_n}\right)^{-1}\right)$ et les séries de termes généraux $\frac{1}{p_n}$ et $\ln\left(\left(1-\frac{1}{p_n}\right)^{-1}\right)$ sont de même nature.
   Il reste donc à étudier la nature de la série de terme général $\ln\left(\left(1-\frac{1}{p_n}\right)^{-1}\right)$.
   Montrons que $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\left(1-\frac{1}{p_n}\right)^{-1}\right) \geqslant \ln\left(\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k}\right)$.
   Soit $n \geqslant$. Alors $\frac{1}{p_n} < 1$ et la série de terme général $\frac{1}{p_n^k}$, $k \in \mathbb{N}$, est une série géométrique convergente de somme : $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} = \left(1-\frac{1}{p_n}\right)^{-1}$.

Soit alors N un entier naturel supérieur ou égal à 2 et $p_1 < p_2 ... < p_n$ la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à N.

Tout entier entre 1 et N s'écrit de manière unique $p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$ où $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i = E\left(\frac{\ln(N)}{\ln(p_i)}\right)$ et deux entiers distincts ont des décompositions distinctes. Donc

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{+\infty} \ln\left(\left(1-\frac{1}{p_k}\right)^{-1}\right) &\geqslant \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\left(1-\frac{1}{p_k}\right)^{-1}\right) \ (\text{car } \forall k \in \mathbb{N}^*,\ \left(1-\frac{1}{p_k}\right)^{-1} > 1) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{p_k^i}\right) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\sum_{i=0}^{\alpha_k} \frac{1}{p_k^i}\right) \\
&= \ln\left(\prod_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=0}^{\alpha_k} \frac{1}{p_k^i}\right)\right) = \ln\left(\sum_{0\leqslant\beta_1\leqslant\alpha_1,\dots,\dots 0\leqslant\beta_n\leqslant\alpha_n} \frac{1}{p_1^{\beta_1}\dots,\ p_n^{\beta_n}}\right) \\
&\geqslant \ln\left(\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k}\right).
\end{aligned}$$

Or $\lim_{N\to+\infty} \ln\left(\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k}\right) = +\infty$ et donc $\sum_{k=1}^{+\infty} \ln\left(\left(1-\frac{1}{p_k}\right)^{-1}\right) = +\infty$.

La série de terme général $\ln\left(1-\frac{1}{p_k}\right)^{-1}$ diverge et il en est de même de la série de terme général $\frac{1}{p_n}$.

(Ceci montre qu'il y a beaucoup de nombres premiers et en tout cas beaucoup plus de nombres premiers que de carrés parfaits par exemple).

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $n = a_p \times 10^p + \dots + a_1 \times 10 + a_0$ où $\forall i \in [\![0,p]\!]$, $a_i \in \{0,1;...,9\}$ et $a_p \neq 0$. Alors $c(n) = p+1$.

   Déterminons p est en fonction de n. On a $10^p \leqslant n < 10^{p+1}$ et donc $p = E(\log(n))$. Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \frac{1}{n(E(\log n)+1)^\alpha}.$$

   Par suite, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln^\alpha(10)}{n\ln^\alpha(n)}$ et la série de terme général u_n converge si et seulement si $\alpha > 1$ (séries de BERTRAND). Redémontrons ce résultat qui n'est pas un résultat de cours.

   La série de terme général $\frac{1}{n\ln n}$ est divergente (voir l'exercice 1, 4)). Par suite, si $\alpha \leqslant 1$, la série de terme général $\frac{1}{n\ln^\alpha(n)}$ est divergente car $\forall n \geqslant 2$, $\frac{1}{n\ln^\alpha(n)} \geqslant \frac{1}{n\ln n}$.

   Soit $\alpha > 1$. Puisque la fonction $x \mapsto \frac{1}{x\ln^\alpha x}$ est continue et strictement décroissante sur $]1,+\infty[$, pour $k \geqslant 3$,

$$\frac{1}{k\ln^\alpha k} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x\ln^\alpha x}\,dx$$

   puis, pour $n \geqslant 3$, en sommant pour $k \in [\![3,n]\!]$

$$\sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k\ln^\alpha k} \leqslant \sum_{k=3}^{n} \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x\ln^\alpha x}\,dx = \int_2^n \frac{1}{x\ln^\alpha x}\,dx = \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{1}{\ln^{\alpha-1}(2)} - \frac{1}{\ln^{\alpha-1}(n)}\right) \leqslant \frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{\ln^{\alpha-1}(2)}.$$

   Ainsi, la suite des sommes partielles de la série à termes positifs, de terme général $\frac{1}{k\ln^\alpha k}$, est majorée et donc la série de terme général $\frac{1}{k\ln^\alpha k}$ converge.

6 Soit $n \geqslant 2$.

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{\ln^a(n+1)}{(n+1)^b} \underset{n\to+\infty}{\to} 0 < 1$$

et d'après la règle de d'ALEMBERT, la série de terme général u_n converge.

6. $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$. Donc

$$\begin{aligned} u_n &\underset{n\to+\infty}{\sim} \tan(u_n) \\ &= \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^a - \left(1-\frac{1}{n}\right)^a}{1+\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^a} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{\frac{2a}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)}{2+O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{a}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Par suite, la série de terme général u_n converge si et seulement si $a = 0$.

7. La fonction $x \mapsto x^{3/2}$ est continue et croissante sur $\mathbb{R}^+$. Donc pour $k \geqslant 1$, $\int_{k-1}^{k} x^{3/2}\,dx \leqslant k^{3/2} \leqslant \int_{k}^{k+1} x^{3/2}\,dx$ puis pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^n x^{3/2}\,dx \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k x^{3/2}\,dx \leqslant \sum_{k=1}^n k^{3/2} \leqslant \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} x^{3/2}\,dx = \int_1^{n+1} x^{3/2}\,dx$$

ce qui fournit

$$\tfrac{2}{5}n^{5/2} \leqslant \sum_{k=1}^n k^{3/2} \leqslant \tfrac{2}{5}\left((n+1)^{5/2}-1\right) \text{ et donc } \sum_{k=1}^n k^{3/2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2n^{5/2}}{5}.$$

Donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2n^{\frac{5}{2}-\alpha}}{5} > 0$. La série de terme général u_n converge si et seulement si $\alpha > \frac{7}{2}$.

8. Pour $n \geqslant 1$,

$$u_n = \left(1+\tfrac{1}{n^\alpha}\right)\left(1+\tfrac{2}{n^\alpha}\right)\ldots\left(1+\tfrac{n}{n^\alpha}\right) - 1 \geqslant \tfrac{1}{n^\alpha} + \tfrac{2}{n^\alpha} + \ldots + \tfrac{n}{n^\alpha} = \tfrac{n(n+1)}{2n^\alpha} > 0.$$

Comme $\frac{n(n+1)}{2n^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^{\alpha-2}}$, si $\alpha \leqslant 3$, on a $\alpha - 2 \leqslant 1$ et la série de terme général u_n diverge.
Si $\alpha > 3$,

$$\begin{aligned} 0 < u_n &\leqslant \left(1+\frac{n}{n^\alpha}\right)^n - 1 = e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right)} - 1 \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} n\ln\left(1+\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\alpha-2}} \text{ terme général d'une série de RIEMANN convergente,} \end{aligned}$$

et, puisque $\alpha - 2 > 1$, la série de terme général u_n converge. Finalement, la série de terme général u_n converge si et seulement si $\alpha > 3$.

Correction de l'exercice 3 ▲

1. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \sin\left(\frac{\pi n^2}{n+1}\right) = \sin\left(\frac{\pi(n^2-1+1)}{n+1}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{n+1} + (n-1)\pi\right) = (-1)^{n-1}\sin\left(\frac{\pi}{n+1}\right).$$

La suite $\left((-1)^{n-1}\sin\left(\frac{\pi}{n+1}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est alternée en signe et sa valeur absolue tend vers 0 en décroissant. La série de terme général u_n converge donc en vertu du critère spécial aux séries alternées.

2. (la suite $\left(\frac{1}{n+(-1)^{n-1}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas décroisante à partir d'un certain rang).

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}\frac{1}{1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{(-1)^n}{n}\left(1+O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{(-1)^n}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série de terme général $\frac{(-1)^n}{n}$ converge en vertu du critère spécial aux séries alternées et la série de terme général $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est absolument convergente. On en déduit que la série de terme général u_n converge.

3. $u_n = \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. Les séries de termes généraux respectifs $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ sont convergentes et la série de terme général $-\frac{1}{2n}$ est divergente. Si la série de terme général u_n convergeait alors la série de terme général $-\frac{1}{2n} = u_n - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ convergerait ce qui n'est pas. Donc la série de terme général u_n diverge.

   Remarque. La série de terme général u_n diverge bien que u_n soit équivalent au terme général d'une série convergente.

4. Si $\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors les deux premières séries divergent et la dernière converge.

   Soit $\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $v_n = e^{in\alpha}$ et $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$ de sorte que $u_n = \varepsilon_n v_n$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons encore $V_n = \sum_{k=1}^{n} v_k$.

   Pour $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, posons enfin $R_n^p = \sum_{k=1}^{n+p} u_k - \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k$. (On effectue alors une transformation d'ABEL).

$$\begin{aligned} R_n^p &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \varepsilon_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \varepsilon_k (V_k - V_{k-1}) = \sum_{k=n+1}^{n+p} \varepsilon_k V_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} \varepsilon_k V_{k-1} = \sum_{k=n+1}^{n+p} \varepsilon_k V_k - \sum_{k=n}^{n+p-1} \varepsilon_{k+1} V_k \\ &= \varepsilon_{n+p} V_{n+p} - \varepsilon_{n+1} V_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}) V_k. \end{aligned}$$

   Maintenant, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $V_n = e^{i\alpha}\frac{e^{in\alpha}-1}{e^{i\alpha}-1} = e^{i\alpha}\frac{\sin(n\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)}$ et donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $|V_n| \leqslant \frac{1}{|\sin(\alpha/2)|}$. Par suite, pour $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$

$$\begin{aligned} |R_n^p| &= \left| \frac{1}{n+p} V_{n+p} - \frac{1}{n+1} V_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) V_k \right| \\ &\leqslant \frac{1}{|\sin(\alpha/2)|}\left(\frac{1}{n+p} + \frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)\right) \\ &= \frac{1}{|\sin(\alpha/2)|}\left(\frac{1}{n+p} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p}\right) = \frac{2}{|\sin(\alpha/2)|(n+1)} \\ &\leqslant \frac{2}{n|\sin(\alpha/2)|}. \end{aligned}$$

   Soit alors ε un réel strictement positif. Pour $n \geqslant E\left(\frac{2}{\varepsilon|\sin(\alpha/2)|}\right)+1$ et p entier naturel non nul quelconque, on a $|R_n^p| < \varepsilon$.

   On a montré que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^* / \forall (n,p) \in \mathbb{N}^*$, $(n \geqslant n_0 \Rightarrow \left|\sum_{k=1}^{n+p} u_k - \sum_{k=1}^{n} u_k\right| < \varepsilon$.

   Ainsi, la série de terme général u_n vérifie le critère de CAUCHY et est donc convergente. Il en est de même des séries de termes généraux respectifs $\frac{\cos(n\alpha)}{n} = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{in\alpha}}{n}\right)$ et $\frac{\sin(n\alpha)}{n} = \mathrm{Im}\left(\frac{e^{in\alpha}}{n}\right)$.

5. Pour $x \in]0,+\infty[$, posons $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. f est dérivable sur $]0,+\infty[$ et $\forall x > e$, $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x} < 0$.

   Donc, la fonction f est décroissante sur $[e,+\infty[$. On en déduit que la suite $\left(\frac{\ln n}{n}\right)_{n\geqslant 3}$ est une suite décroissante. Mais alors la série de terme général $(-1)^n\frac{\ln n}{n}$ converge en vertu du critère spécial aux séries alternées.

6. • Si $\deg P \geqslant \deg Q$, u_n ne tend pas vers 0 et la série de terme général u_n est grossièrement divergente.

   • Si $\deg P \leqslant \deg Q - 2$, $u_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et la série de terme général u_n est absolument convergente.

   • Si $\deg P = \deg Q - 1$, $u_n \underset{n\to+\infty}{=} (-1)^n \frac{\mathrm{dom}P}{n\,\mathrm{dom}Q} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. u_n est alors somme de deux termes généraux de séries convergentes et la série de terme général u_n converge.

   En résumé, la série de terme général u_n converge si et seulement si $\deg P < \deg Q$.

7. $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ puis pour $n \geqslant 2$, $n!e = 1 + n + \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}$.

   Pour $0 \leqslant k \leqslant n-2$, $\frac{n!}{k!}$ est un entier divisible par $n(n-1)$ et est donc un entier pair que l'on note $2K_n$. Pour $n \geqslant 2$, on obtient

$$\sin(n!\pi e) = \sin\left(2K_n\pi + (n+1)\pi + \pi\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}\right) = (-1)^{n+1}\sin\left(\pi\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}\right).$$

   Déterminons un développement limité à l'ordre 2 de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}$ quand n tend vers $+\infty$.

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{n!}{k!}.$$

   Maintenant, pour $k \geqslant n+3$, $\frac{n!}{k!} = \frac{1}{k(k-1)\ldots(n+1)} \leqslant \frac{1}{(n+1)^{k-n}}$ et donc

$$\sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \leqslant \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{k-n}} = \frac{1}{(n+1)^3} \times \frac{1}{1-\frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n^3}.$$

   On en déduit que $\sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Il reste

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-1} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

   Finalement , $\sin(n!\pi e) \underset{n\to+\infty}{=} (-1)^{n+1}\sin\left(\frac{\pi}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} + \left(\frac{1}{n^2}\right)$.

   $\sin(n!\pi e)$ est somme de deux termes généraux de séries convergentes et la série de terme général $\sin(n!\pi e)$ converge.

   Si $p \geqslant 2$, $|\sin^p(n!\pi e)| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^p}{n^p}$ et la série de terme général $\sin^p(n!\pi e)$ converge absolument.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. $\frac{n+1}{3^n} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par suite, la série de terme général $\frac{n+1}{3^n}$ converge.

   1er calcul. Soit $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n}$. Alors

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}S &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{3^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} \\ &= (S-1) - \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{1}{3}} = S - \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

   On en déduit que $S = \frac{9}{4}$.

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n} = \frac{9}{4}.}$$

2ème calcul. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)x^k.$$

Par suite, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)x^k = f_n'(x) = \left(\frac{x^n-1}{x-1}\right)'(x) = \frac{nx^{n-1}(x-1)-(x^n-1)}{(x-1)^2} = \frac{(n-1)x^n-nx^{n-1}+1}{(x-1)^2}.$$

Pour $x = \frac{1}{3}$, on obtient $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k+1}{3^k} = \frac{\frac{n-1}{3^n} - \frac{n}{3^{n-1}}+1}{\left(\frac{1}{3}-1\right)^2}$ et quand n tend vers l'infini, on obtient de nouveau $S = \frac{9}{4}$.

2. Pour $k \geqslant 3$, $\frac{2k-1}{k^3-4k} = \frac{3}{8(k-2)} + \frac{1}{4k} - \frac{5}{8(k+2)}$. Puis

$$\begin{aligned}
\sum_{k=3}^{n} \frac{2k-1}{k^3-4k} &= \frac{3}{8}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k-2} + \frac{1}{4}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k} - \frac{5}{8}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k+2} = \frac{3}{8}\sum_{k=1}^{n-2}\frac{1}{k} + \frac{1}{4}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k} - \frac{5}{8}\sum_{k=5}^{n+2}\frac{1}{k} \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{3}{8}\left(1+\frac{1}{2}+\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k}\right) + \frac{1}{4}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k} - \frac{5}{8}\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k}\right) + o(1) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{3}{8}\times\frac{3}{2} + \frac{5}{8}\times\frac{7}{12} + o(1) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{89}{96} + o(1).
\end{aligned}$$

La série proposée est donc convergente de somme $\frac{89}{96}$.

$$\boxed{\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{2n-1}{n^3-4n} = \frac{89}{96}.}$$

3. Pour $k \in \mathbb{N}$, on a $1^{3k} + j^{3k} + (j^2)^{3k} = 3$ puis $1^{3k+1} + j^{3k+1} + (j^2)^{3k+1} = 1 + j + j^2 = 0$ et $1^{3k+2} + j^{3k+2} + (j^2)^{3k+2} = 1 + j^2 + j^4 = 0$. Par suite,

$$e + e^j + e^{j^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1^n + j^n + (j^2)^n}{n!} = 3\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!},$$

et donc

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} &= \frac{1}{3}(e + e^j + e^{j^2}) = \frac{1}{3}\left(e + e^{-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}} + e^{-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = \frac{1}{3}\left(e + 2e^{-1/2}\mathrm{Re}(e^{-i\sqrt{3}/2})\right) \\
&= \frac{1}{3}\left(e + 2e^{-1/2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right).
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} = \frac{1}{3}\left(e + \frac{2}{\sqrt{e}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right).}$$

4.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k-1}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{2}{\sqrt{k}}\right) &= \sum_{k=2}^{n}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{k-1}} - \frac{1}{\sqrt{k}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)\right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) \text{ (somme télescopique)} \\
&\underset{n\to+\infty}{=} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + o(1)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n-1}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{2}{\sqrt{n}}\right)=1-\frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

5. $\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)\underset{n\to+\infty}{=}\frac{(-1)^n}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Donc la série de terme général $\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)$ converge.

   Posons $S=\sum_{k=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^k}{k}\right)$ puis pour $n\geqslant 2$, $S_n=\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1+\frac{(-1)^k}{k}\right)$. Puisque la série converge $S=\lim_{n\to+\infty}S_n=\lim_{p\to+\infty}S_{2p+1}$ avec

$$\begin{aligned}S_{2p+1}&=\sum_{k=2}^{2p+1}\ln\left(1+\frac{(-1)^k}{k}\right)=\sum_{k=1}^{p}\left(\ln\left(1-\frac{1}{2k+1}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right)\right)\\&=\sum_{k=1}^{p}(\ln(2k)-\ln(2k+1)+\ln(2k+1)-\ln(2k))=0\end{aligned}$$

   et quand p tend vers $+\infty$, on obtient $S=0$.

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)=0.}$$

6. Si $a\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$ alors, pour tout entier naturel n, $\frac{a}{2^n}\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$ et donc $\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)>0$.
   Ensuite, $\ln\left(\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)\right)\underset{n\to+\infty}{=}\ln\left(1+O\left(\frac{1}{2^{2n}}\right)\right)\underset{n\to+\infty}{=}O\left(\frac{1}{2^{2n}}\right)$ et la série converge. Ensuite,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\ln\left(\cos\left(\frac{a}{2^k}\right)\right)&=\ln\left(\prod_{k=0}^{n}\cos\left(\frac{a}{2^k}\right)\right)=\ln\left(\prod_{k=0}^{n}\frac{\sin\left(2\times\frac{a}{2^k}\right)}{2\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}\right)=\ln\left(\frac{1}{2^{n+1}}\prod_{k=0}^{n}\frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}\right)\\&=\ln\left(\frac{\sin(2a)}{2^{n+1}\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}\right)\ \text{(produit télescopique)}\\&\underset{n\to+\infty}{\sim}\ln\left(\frac{\sin(2a)}{2^{n+1}\times\frac{a}{2^n}}\right)=\ln\left(\frac{\sin(2a)}{2a}\right).\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall a\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[,\ \sum_{n=0}^{+\infty}\ln\left(\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)\right)=\ln\left(\frac{\sin(2a)}{2a}\right).}$$

7. Vérifions que pour tout réel x on a $\operatorname{th}(2x)=\frac{2\operatorname{th}x}{1+\operatorname{th}^2x}$. Soit $x\in\mathbb{R}$.
   $\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x=\frac{1}{4}((e^x+e^{-x})^2+(e^x-e^{-x})^2)=\frac{1}{2}(e^{2x}+e^{-2x})=\operatorname{ch}(2x)$ et $2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})(e^x+e^{-x})=\frac{1}{2}(e^{2x}-e^{-2x})=\operatorname{sh}(2x)$ puis

$$\frac{2\operatorname{th}x}{1+\operatorname{th}^2x}=\frac{2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x}{\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x}=\frac{\operatorname{sh}(2x)}{\operatorname{ch}(2x)}=\operatorname{th}(2x).$$

   Par suite, pour $x\in\mathbb{R}^*$, $\operatorname{th}x=\frac{2}{\operatorname{th}(2x)}-\frac{1}{\operatorname{th}x}$. Mais alors, pour $a\in\mathbb{R}^*$ et $n\in\mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^k}\operatorname{th}\left(\frac{a}{2^k}\right)&=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^k}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\frac{a}{2^{k-1}}}-\frac{1}{\operatorname{th}\frac{a}{2^k}}\right)=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2^{k-1}\operatorname{th}\frac{a}{2^{k-1}}}-\frac{1}{2^k\operatorname{th}\frac{a}{2^k}}\right)\\&=\frac{2}{\operatorname{th}(2a)}-\frac{1}{2^n\operatorname{th}\frac{a}{2^n}}\ \text{(somme télescopique)}\\&\underset{n\to+\infty}{\to}\frac{2}{\operatorname{th}(2a)}-\frac{1}{a},\end{aligned}$$

   ce qui reste vrai quand $a=0$.

$$\boxed{\forall a \in \mathbb{R},\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n}\,\mathrm{th}\left(\frac{a}{2^n}\right) = \frac{2}{\mathrm{th}(2a)} - \frac{1}{a}.}$$

Correction de l'exercice 5 ▲

Il faut vérifier que $nu_n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} 0 < (2n)u_{2n} &= 2(\underbrace{u_{2n} + \ldots + u_{2n}}_{n}) \leqslant 2\sum_{k=n+1}^{2n} u_k \text{ (car la suite } u \text{ est décroissante)} \\ &= 2(S_{2n} - S_n). \end{aligned}$$

Puisque la série de terme général u_n converge, $\lim_{n\to+\infty} 2(S_{2n} - S_n) = 0$ et donc $\lim_{n\to+\infty}(2n)u_{2n} = 0$.
Ensuite, $0 < (2n+1)u_{2n+1} \leqslant (2n+1)u_{2n} = (2n)u_{2n} + u_{2n} \underset{n\to+\infty}{\to} 0$. Donc les suites des termes de rangs pairs et impairs extraites de la suite $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent et ont même limite à savoir 0. On en déduit que $\lim_{n\to+\infty} nu_n = 0$ ou encore que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Contre exemple avec u non monotone. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \begin{cases} 0 \text{ si } n = 0 \\ \frac{1}{n} \text{ si } n \text{ est un carré parfait non nul} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$. La suite u est positive et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} < +\infty$. Pourtant, $p^2 u_{p^2} = 1 \underset{p\to+\infty}{\to} 1$ et la suite (nu_n) admet une suite extraite convergeant vers 1. On a donc pas $\lim_{n\to+\infty} nu_n = 0$.

Correction de l'exercice 6 ▲

Soit σ une permutation de $[\![1,n]\!]$. Montrons que la suite $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\sigma(k)}{k^2}$, $n \geqslant 1$, ne vérifie pas le critère de CAUCHY. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} S_{2n} - S_n &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sigma(k)}{k^2} \geqslant \frac{1}{(2n)^2} \sum_{k=n+1}^{2n} \sigma(k) \\ &\geqslant \frac{1}{4n^2}(1+2+\ldots+n) \text{ (car les } n \text{ entiers } \sigma(k),\ 1 \leqslant k \leqslant n, \text{ sont strictement positifs et deux à deux distincts)} \\ &= \frac{n(n+1)}{8n^2} \geqslant \frac{n^2}{8n^2} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Si la suite (S_n) converge, on doit avoir $\lim_{n\to+\infty}(S_{2n} - S_n) = 0$ ce qui contredit l'inégalité précédente. Donc la série de terme général $\frac{\sigma(n)}{n^2}$, $n \geqslant 1$, diverge.

Correction de l'exercice 7 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $v_n = \ln(1+u_n)$, $w_n = \frac{u_n}{1+u_n}$ et $t_n = \int_0^{u_n} \frac{dx}{1+x^e}$.
• Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$, alors $0 \leqslant u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} w_n$. Dans ce cas, les séries de termes généraux u_n, v_n et w_n sont de même nature.
D'autre part, pour $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_n}{1+u_n^e} \leqslant t_n \leqslant u_n$ puis $\frac{1}{1+u_n^e} \leqslant \frac{t_n}{u_n} \leqslant 1$et donc $t_n \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$. Les séries de termes généraux u_n et t_n sont aussi de même nature.
• Si u_n ne tend pas vers 0, la série de terme général u_n est grossièrement divergente. Puisque $u_n = e^{v_n} - 1$, v_n ne tend pas vers 0 et la série de terme général v_n est grossièrement divergente. Dans ce cas aussi, les séries de termes généraux sont de même nature.
De même, puisque $w_n = \frac{u_n}{1+u_n} < 1$, on a $u_n = \frac{w_n}{1-w_n}$ et w_n ne peut tendre vers 0.
Enfin, puisque u_n ne tend pas vers 0, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout entier naturel N, il existe $n = n(N) \geqslant N$ tel que $u_n \geqslant \varepsilon$. Pour cet ε et ces n, on a $t_n \geqslant \int_0^{\varepsilon} \frac{dx}{1+x^e} > 0$ (fonction continue, positive et non nulle) et la suite t_n ne tend pas vers 0. Dans le cas où u_n ne tend pas vers 0, les quatre séries sont grossièrement divergentes.

Correction de l'exercice 8 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = (n+1)!\left(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right)$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(n+1)!}{k!} \\ &= 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)} + \sum_{k=n+6}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots k} \end{aligned}$$

On a $0 < \sum_{k=n+6}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots k} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^{k-(n+1)}} = \frac{1}{(n+2)^5} \frac{1}{1-\frac{1}{n+2}} = \frac{1}{(n+2)^4(n+1)} \leqslant \frac{1}{n^5}$. On en déduit que $\sum_{k=n+6}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots k} \underset{n\text{-}}{=} o\left(\frac{1}{n^4}\right)$. Donc

$$\begin{aligned} u_n &\underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-1} + \frac{1}{n^2}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-1}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{-1} + \frac{1}{n^3}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-1}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{-1}\left(1+\frac{4}{n}\right)^{-1} + \frac{1}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n}\left(1-\frac{2}{n}+\frac{4}{n^2}-\frac{8}{n^3}\right) + \frac{1}{n^2}\left(1-\frac{2}{n}+\frac{4}{n^2}\right)\left(1-\frac{3}{n}+\frac{9}{n^2}\right) + \frac{1}{n^3}\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(1-\frac{3}{n}\right)\left(1-\frac{4}{n}\right) \\ &\quad + \frac{1}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n}\left(1-\frac{2}{n}+\frac{4}{n^2}-\frac{8}{n^3}\right) + \frac{1}{n^2}\left(1-\frac{5}{n}+\frac{19}{n^2}\right) + \frac{1}{n^3}\left(1-\frac{9}{n}\right) + \frac{1}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right). \end{aligned}$$

Finalement

$$\boxed{(n+1)!\left(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right) \underset{n\to+\infty}{=} 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right).}$$

Correction de l'exercice 9 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = \sin\left(\pi(2+\sqrt{3})^n\right)$. D'après la formule du binôme de NEWTON, $(2+\sqrt{3})^n = A_n + B_n\sqrt{3}$ où A_n et B_n sont des entiers naturels. Un calcul conjugué fournit aussi $(2-\sqrt{3})^n = A_n - B_n\sqrt{3}$. Par suite, $(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n = 2A_n$ est un entier pair. Par suite, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \sin\left(2A_n\pi - \pi(2-\sqrt{3})^n\right) = -\sin\left(\pi(2-\sqrt{3})^n\right).$$

Mais $0 < 2-\sqrt{3} < 1$ et donc $(2-\sqrt{3})^n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$. On en déduit que $|u_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} \pi(2-\sqrt{3})^n$ terme général d'une série géométrique convergente. Donc la série de terme général u_n converge.

Correction de l'exercice 10 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\left(\sqrt{u_n} - \frac{1}{n}\right)^2$ et donc $0 \leqslant \frac{\sqrt{u_n}}{n} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{n^2}\right)$. Comme la série terme général $\frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{n^2}\right)$ converge, la série de terme général $\frac{\sqrt{u_n}}{n}$ converge.

Correction de l'exercice 11 ▲

Pour $n \geqslant 2$, $v_n = \frac{u_n+1-1}{(1+u_1)\dots(1+u_n)} = \frac{1}{(1+u_1)\dots(1+u_{n-1})} - \frac{1}{(1+u_1)\dots(1+u_n)}$ et d'autre part $v_1 = 1 - \frac{1}{1+u_1}$. Donc, pour $n \geqslant 2$

$$\sum_{k=1}^{n} v_k = 1 - \frac{1}{(1+u_1)\dots(1+u_n)} \text{ (somme télescopique).}$$

Si la série de terme général u_n converge alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ et donc $0 < u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(1+u_n)$. Donc la série de terme général $\ln(1+u_n)$ converge ou encore la suite $\left(\ln\left(\prod_{k=1}^{n}(1+u_k)\right)\right)_{n\geqslant 1}$ converge vers un certain réel ℓ. Mais alors la suite $\left(\prod_{k=1}^{n}(1+u_k)\right)_{n\geqslant 1}$ converge vers le réel strictement positif $P = e^{\ell}$. Dans ce cas, la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} v_k\right)_{n\geqslant 1}$ converge vers $1 - \frac{1}{P}$.
Si la série de terme général u_n diverge alors la série de terme général $\ln(1+u_n)$ diverge vers $+\infty$ et il en est de même que la suite $\left(\prod_{k=1}^{n}(1+u_k)\right)_{n\geqslant 1}$. Dans ce cas, la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} v_k\right)_{n\geqslant 1}$ converge vers 1.

Correction de l'exercice 12 ▲

Etudions tout d'abord la convergence de la série de terme général $\frac{u_n}{S_n}$.
Si $\frac{u_n}{S_n}$ tend vers 0 alors

$$0 < \frac{u_n}{S_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\ln\left(1 - \frac{u_n}{S_n}\right) = \ln\left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right) = \ln(S_n) - \ln(S_{n-1}).$$

Par hypothèse, $\lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty$. On en déduit que la série de terme général $\ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$ est divergente car $\sum_{k=1}^{n} \ln(S_k) - \ln(S_{k-1}) = \ln(S_n) - \ln(S_0) \underset{n\to+\infty}{\to} +\infty$. Dans ce cas, la série de terme général $\frac{u_n}{S_n}$ diverge ce qui est aussi le cas si $\frac{u_n}{S_n}$ ne tend pas vers 0.
Donc, dans tous les cas, la série de terme général $\frac{u_n}{S_n}$ diverge.
Si $\alpha \leqslant 1$, puisque S_n tend vers $+\infty$, à partir d'un certain rang on a $S_n^{\alpha} \leqslant S_n$ et donc $\frac{u_n}{S_n^{\alpha}} \geqslant \frac{u_n}{S_n}$. Donc, si $\alpha \leqslant 1$, la série de terme général $\frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ diverge.
Si $\alpha > 1$, puisque la suite (S_n) est croissante,

$$0 < \frac{u_n}{S_n^{\alpha}} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^{\alpha}} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{S_n^{\alpha}} \leqslant \frac{dx}{x^{\alpha}} = \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}}\right),$$

qui est le terme général d'une série télescopique convergente puisque $\frac{1}{S_n^{\alpha-1}}$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Dans ce cas, la série de terme général $\frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ converge.

$$\boxed{\text{La série de terme général } \frac{u_n}{S_n^{\alpha}} \text{ converge si et seulement si } \alpha > 1.}$$

Correction de l'exercice 13 ▲

Si $\alpha < 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} n^{-2\alpha}$ et si $\alpha = 0$, $u_n = 1 + (-1)^n$. Donc si $\alpha \leqslant 0$, u_n ne tend pas vers 0. La série de terme général u_n diverge grossièrement dans ce cas.
On suppose dorénavant que $\alpha > 0$. Pour tout entier naturel non nul n, $|u_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\alpha}}$ et donc la série de terme général u_n converge absolument si et seulement si $\alpha > 1$.
Il reste à étudier le cas où $0 < \alpha \leqslant 1$. On a $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}} + \frac{1}{n^{2\alpha}}$. La suite $\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)_{n\geqslant 1}$ tend vers 0 en décroissant et donc la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n^{\alpha}}$ converge en vertu du critère spécial aux séries alternées. On en déduit que la série de terme général u_n converge si et seulement si la série de terme général $\frac{1}{n^{2\alpha}}$ converge ou encore si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.
En résumé

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Si } \alpha \leqslant 0, \text{ la série de terme général } \frac{1+(-1)^n n^{\alpha}}{n^{2\alpha}} \text{ diverge grossièrement,}\\ \text{si } 0 < \alpha \leqslant \frac{1}{2}, \text{ la série de terme général } \frac{1+(-1)^n n^{\alpha}}{n^{2\alpha}} \text{ diverge,}\\ \text{si } \frac{1}{2} < \alpha \leqslant 1, \text{ la série de terme général } \frac{1+(-1)^n n^{\alpha}}{n^{2\alpha}} \text{ est semi convergente,}\\ \text{si } \alpha > 1, \text{ la série de terme général } \frac{1+(-1)^n n^{\alpha}}{n^{2\alpha}} \text{ converge absolument.}\end{array}}$$

Correction de l'exercice 14 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note S_n la somme des n premiers termes de la série considérée et on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Il est connu que $H_n \underset{n\to+\infty}{=} \ln n + \gamma + o(1)$.
Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
S_{m(p+q)} &= \left(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2p-1}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2q}\right)+\left(\frac{1}{2p+1}+\ldots+\frac{1}{4p-1}\right)-\left(\frac{1}{2q+2}+\ldots+\frac{1}{4q}\right)+\ldots \\
&+\left(\frac{1}{2(m-1)p+1}+\ldots+\frac{1}{2mp-1}\right)-\left(\frac{1}{2(m-1)q+2}+\ldots+\frac{1}{2mq}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{mp}\frac{1}{2k-1}-\sum_{k=1}^{mq}\frac{1}{2k}=\sum_{k=1}^{2mp}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{mp}\frac{1}{2k}-\sum_{k=1}^{mq}\frac{1}{2k}=H_{2mp}-\frac{1}{2}(H_{mp}+H_{mq}) \\
&\underset{m\to+\infty}{=} (\ln(2mp)+\gamma)-\frac{1}{2}(\ln(mp)+\gamma+\ln(mq)+\gamma)+o(1)=\ln 2+\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)+o(1).
\end{aligned}$$

Ainsi, la suite extraite $(S_{m(p+q)})_{m\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\ln 2+\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)$.
Montrons alors que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique entier naturel non nul m_n tel que $m_n(p+q) \leqslant n < (m_n+1)(p+q)$ à savoir $m_n = E\left(\frac{n}{p+q}\right)$.

$$\begin{aligned}
|S_n - S_{m_n(p+q)}| &\leqslant \frac{1}{2m_np+1}+\ldots+\frac{1}{2(m_n+1)p-1}+\frac{1}{2m_nq+2}+\frac{1}{2(m_n+1)q} \\
&\leqslant \frac{p}{2m_np+1}+\frac{q}{2m_nq+2}\leqslant\frac{1}{2m_n}+\frac{1}{2m_n}=\frac{1}{m_n}.
\end{aligned}$$

Soit alors $\varepsilon > 0$.
Puisque $\lim_{n\to+\infty} m_n = +\infty$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que pour $n \geqslant n_0$, $\frac{1}{m_n} < \frac{\varepsilon}{2}$ et aussi $\left|S_{m_n(p+q)} - \ln 2 - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pour $n \geqslant n_0$, on a alors

$$\begin{aligned}
\left|S_n-\ln 2-\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)\right| &\leqslant |S_n-S_{m_n(p+q)}|+\left|S_{m_n(p+q)}-\ln 2-\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)\right| \leqslant \frac{1}{m_n}+\left|S_{m_n(p+q)}-\ln 2-\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)\right| \\
&< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.
\end{aligned}$$

On a montré que $\forall\varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}^* / \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geqslant n_0 \Rightarrow \left|S_n - \left(\ln 2 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)\right)\right| < \varepsilon)$ et donc, la série proposée converge et a pour somme $\ln 2+\frac{1}{2}\ln\left(\frac{p}{q}\right)$.

Correction de l'exercice 15 ▲

La série proposée est le produit de CAUCHY de la série de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$, $n \geqslant 1$, par elle même.
• Si $\alpha > 1$, on sait que la série de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$ converge absolument et donc que la série proposée converge.
• Si $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$, pour $0 < k < n$ on a $0 < k(n-k) \leqslant \frac{n}{2}\left(n-\frac{n}{2}\right) = \frac{n^2}{4}$. Donc $u_n \geqslant \frac{n-1}{\left(\frac{n^2}{4}\right)^\alpha}$ avec $\frac{n-1}{\left(\frac{n^2}{4}\right)^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{4^\alpha}{n^{2\alpha-1}}$.
Comme $2\alpha - 1 \leqslant 1$, la série proposée diverge.
• Si $\alpha < 0$, $u_n \geqslant \frac{1}{(n-1)^\alpha}$ et donc u_n ne tend pas vers 0. Dans ce cas, la série proposée diverge grossièrement.

Correction de l'exercice 16 ▲

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}2n^3-3n^2+1 &= 2(n+3)(n+2)(n+1)-15n^2-22n-11 = 2(n+3)(n+2)(n+1)-15(n+3)(n+2)+53n+79\\ &= 2(n+3)(n+2)(n+1)-15(n+3)(n+2)+53(n+3)-80\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2n^3-3n^2+1}{(n+3)!} &= \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2}{n!}-\frac{15}{(n+1)!}+\frac{53}{(n+2)!}-\frac{80}{(n+3)!}\right) = 2e-15(e-1)+53(e-2)-80\left(e-\frac{5}{2}\right)\\ &= -40e+111.\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2n^3-3n^2+1}{(n+3)!} = -40e+111.}$$

2. Pour $n\in\mathbb{N}$, on a $u_{n+1}=\frac{n+1}{a+n+1}u_n$. Par suite $(n+a+1)u_{n+1}=(n+1)u_n=(n+a)u_n+(1-a)u_n$ puis

$$(1-a)\sum_{k=1}^{n}u_k=\sum_{k=1}^{n}(k+a+1)u_{k+1}-\sum_{k=1}^{n}(k+a)u_k=(n+a+1)u_{n+1}-(a+1)u_1=(n+a+1)u_{n+1}-1.$$

Si $a=1$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $u_n=\frac{1}{n+1}$. Dans ce cas, la série diverge.

Si $a\neq 1$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n}u_k=\frac{1}{1-a}((n+a+1)u_{n+1}-1)=\frac{1}{a-1}-\frac{1}{a-1}(a+n+1)u_{n+1}$.

Si $a>1$, la suite u est strictement positive et la suite des sommes partielles (S_n) est majorée par $\frac{1}{a-1}$. Donc la série de terme général u_n converge. Il en est de même de la suite $((a+n+1)u_{n+1})$. Soit $\ell=\lim_{n\to+\infty}(a+n+1)u_{n+1}$.

Si $\ell\neq 0$, $u_{n+1}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{\ell}{n+a+1}$ contredisant la convergence de la série de terme général u_n. Donc $\ell=0$ et

$$\text{si } a>1,\ \sum_{n=1}^{+\infty}u_n=\frac{1}{a-1}.$$

Si $0<a<1$, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $u_n\geqslant\frac{1\times2\times\ldots\times n}{2\times3\ldots\times(n+1)}=\frac{1}{n+1}$. Dans ce cas, la série diverge.

Correction de l'exercice 17 ▲

Pour tout entier naturel non nul n, $0<\frac{1}{2^pn^{p-1}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2n)^p}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(n+k)^p}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^p}=\frac{1}{n^{p-1}}$ et la série de terme général u_n converge si et seulement si $p>2$.

Correction de l'exercice 18 ▲

(On applique la règle de RAABE-DUHAMEL qui n'est pas un résultat de cours.) Pour $n\in\mathbb{N}$, posons $u_n=\frac{n!}{(a+1)(a+2)\ldots(a+n)}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{n+1}{a+n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{a+1}{n}\right)^{-1}\underset{n\to+\infty}{=}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{a+1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\underset{n\to+\infty}{=}1-\frac{a}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

et on sait qu'il existe un réel strictement positif K tel que $u_n\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{K}{n^a}$.

Correction de l'exercice 19 ▲

Pour tout entier naturel non nul n, $0<\frac{1}{2^pn^{p-1}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2n)^p}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(n+k)^p}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^p}=\frac{1}{n^{p-1}}$ et la série de terme général u_n converge si et seulement si $p>2$.

Correction de l'exercice 20 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$. Puisque la série de terme général $\frac{1}{k^2}$, $k \geqslant 1$, converge, la suite (R_n) est définie et tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
$0 < \frac{1}{k^2} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ et puisque la série de terme général $\frac{1}{k^2}$ converge, la règle de l'équivalence des restes de séries à termes positifs convergentes permet d'affirmer que

$$\begin{aligned}
R_n &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) \\
&= \lim_{N\to+\infty} \sum_{k=n+1}^{N} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) \text{ (surtout ne pas décomposer en deux sommes)} \\
&= \lim_{N\to+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N}\right) \text{ (somme télescopique)} \\
&= \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

ou encore $R_n \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
Plus précisément, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $R_n - \frac{1}{n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)} = -\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2(k-1)}$.
Or $-\frac{1}{k^2(k-1)} + \frac{1}{k(k-1)(k-2)} = \frac{2}{k^2(k-1)(k-2)}$ puis
$\frac{2}{k^2(k-1)(k-2)} - \frac{2}{k(k-1)(k-2)(k-3)} = -\frac{6}{k^2(k-1)(k-2)(k-3)}$ et donc

$$\begin{aligned}
R_n &= \frac{1}{n} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2(k-1)} = \frac{1}{n} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)(k-2)} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{2}{k^2(k-1)(k-2)} \\
&= \frac{1}{n} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)(k-2)} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{2}{k(k-1)(k-2)(k-3)} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{6}{k^2(k-1)(k-2)(k-3)}
\end{aligned}$$

Ensuite $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2(k-1)(k-2)(k-3)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^5} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{4n^4}$ ou encore $-\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{6}{k^2(k-1)(k-2)(k-3)} \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{3}{2n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$. Puis

$$\begin{aligned}
\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)(k-2)} &= \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{N} \left(\frac{1}{(k-1)(k-2)} - \frac{1}{k(k-1)}\right) = \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{N(N-1)}\right) = \frac{1}{2n(n-1)} \\
&= \frac{1}{2n^2}\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-1} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} + \frac{1}{2n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{2}{k(k-1)(k-2)(k-3)} &= \lim_{N\to+\infty} \frac{2}{3} \sum_{k=n+1}^{N} \left(\frac{1}{(k-1)(k-2)(k-3)} - \frac{1}{k(k-1)(k-2)}\right) \\
&= \lim_{N\to+\infty} \frac{2}{3}\left(\frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \frac{1}{N(N-1)(N-2)}\right) = \frac{2}{3n(n-1)(n-2)} \\
&= \frac{2}{3n^3}\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-1}\left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-1} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{2}{3n^3}\left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\left(1 + \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{2}{3n^3} + \frac{2}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)
\end{aligned}$$

et finalement

$$R_n \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{2n^3}+\frac{1}{2n^4}\right) + \left(\frac{2}{3n^3}+\frac{2}{n^4}\right) - \frac{3}{2n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right).}$$

Correction de l'exercice 21 ▲

1. La suite $\left(\frac{\ln n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0, en décroissant à partir du rang 3 (fourni par l'étude de la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ sur $[e,+\infty[$) et donc la série de terme général $(-1)^n \frac{\ln n}{n}$, $n \geqslant 1$, converge en vertu du critère spécial aux séries alternées. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $R_n = \sum_{p=n+1}^{+\infty} (-1)^p \frac{\ln p}{p}$.

   $(-1)^k \frac{\ln k}{k}$ n'est pas de signe constant à partir d'un certain rang et on ne peut donc lui appliquer la règle de l'équivalence des restes.

   Par contre, puisque la série de terme général $(-1)^k \frac{\ln k}{k}$ converge, on sait que l'on peut associer les termes à volonté et pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a

$$R_{2k-1} = \sum_{p=2k}^{+\infty} (-1)^p \frac{\ln p}{p} = \sum_{p=k}^{+\infty} \left(\frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{\ln(2p+1)}{2p+1}\right).$$

   Puisque la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ est décroissante sur $[e,+\infty[$ et donc sur $[3,+\infty[$, pour $p \geqslant 2$, $\frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{\ln(2p+1)}{2p+1} \geqslant 0$ et on peut utiliser la règle de l'équivalence des restes de séries à termes positifs convergentes.

   Cherchons déjà un équivalent plus simple de $\frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{\ln(2p+1)}{2p+1}$ quand p tend vers $+\infty$.

$$\begin{aligned}
\frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{\ln(2p+1)}{2p+1} &= \frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{1}{2p}\left(\ln(2p) + \ln\left(1+\frac{1}{2p}\right)\right)\left(1+\frac{1}{2p}\right)^{-1} \\
&\underset{p\to+\infty}{=} \frac{\ln(2p)}{2p} - \frac{1}{2p}\left(\ln(2p) + \frac{1}{2p} + o\left(\frac{1}{p}\right)\right)\left(1 - \frac{1}{2p} + o\left(\frac{1}{p}\right)\right) \\
&\underset{p\to+\infty}{=} \frac{\ln(2p)}{4p^2} + o\left(\frac{\ln p}{p^2}\right) \underset{p\to+\infty}{=} \frac{\ln p + \ln 2}{4p^2} + o\left(\frac{\ln p}{p^2}\right) \\
&\underset{p\to+\infty}{\sim} \frac{\ln p}{4p^2}.
\end{aligned}$$

   et donc $R_{2k-1} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{1}{4} \sum_{p=k}^{+\infty} \frac{\ln p}{p^2}$.

   Cherchons maintenant un équivalent simple de $\frac{\ln p}{p^2}$ de la forme $v_p - v_{p+1}$.

   Soit $v_p = \frac{\ln p}{p} - \frac{\ln(p+1)}{p+1}$ (suggéré par $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1-\ln x}{x^2} \underset{x\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln x}{x^2}$). Alors

$$\begin{aligned}
v_p - v_{p+1} &= \frac{\ln p}{p} - \frac{1}{p}\left(\ln p + \ln\left(1+\frac{1}{p}\right)\right)\left(1+\frac{1}{p}\right)^{-1} \underset{p\to+\infty}{=} \frac{\ln p}{p} - \frac{1}{p}\left(\ln p + \frac{1}{p} + o\left(\frac{1}{p}\right)\right)\left(1 - \frac{1}{p} + o\left(\frac{1}{p}\right)\right) \\
&\underset{p\to+\infty}{\sim} \frac{\ln p}{p^2}.
\end{aligned}$$

   D'après la règle de l'équivalence des restes de séries à termes positifs convergentes, $R_{2k-1} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{1}{4} \sum_{p=k}^{+\infty} \left(\frac{\ln p}{p} - \frac{\ln(p+1)}{p+1}\right)$ $\frac{\ln k}{4k}$ (série télescopique).

   Puis, $R_{2k} = R_{2k-1} - \frac{\ln(2k)}{2k} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{\ln k}{4k} - \frac{\ln(2k)}{2k} + o\left(\frac{\ln k}{k}\right) \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{\ln k}{4k} - \frac{\ln k}{2k} + o\left(\frac{\ln k}{k}\right) \underset{k\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln k}{4k} + o\left(\frac{\ln k}{k}\right)$.

   En résumé, $R_{2k-1} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{\ln k}{4k}$ et $R_{2k} \underset{k\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln k}{4k}$.

   On peut unifier : $R_{2k-1} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{\ln k}{4k} \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{\ln(2k-1)}{2(2k-1)}$ et $R_{2k} \underset{k\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln k}{4k} \underset{k\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln(2k)}{2(2k)}$. Finalement,

$$\boxed{\sum_{p=n+1}^{+\infty}(-1)^p\frac{\ln p}{p} \underset{n\to+\infty}{\sim} (-1)^{n-1}\frac{\ln n}{2n}.}$$

2. $\sum n^n$ est une série à termes positifs grossièrement divergente.

   1 ère solution.

   $0 < n^n \underset{n\to+\infty}{\sim} n^n-(n-1)^{n-1}$ car $\frac{n^n-(n-1)^{n-1}}{n^n} = 1-\frac{1}{n-1}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n \underset{n\to+\infty}{=} 1-\frac{1}{ne}+o\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\to} 1$.

   D'après la règle de l'équivalence des sommes partielles de séries à termes positifs divergentes,

$$\sum_{p=1}^n p^p \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{p=2}^n p^p \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{p=2}^n (p^p-(p-1)^{p-1}) = n^n-1 \underset{n\to+\infty}{\sim} n^n.$$

   (La somme est équivalente à son dermier terme.)

   2 ème solution. Pour $n \geqslant 3$, $0 \leqslant \frac{1}{n^n}\sum_{p=1}^{n-2} p^p \leqslant \frac{1}{n^n}\times(n-2)(n-2)^{n-2} \leqslant \frac{n^{n-1}}{n^n} = \frac{1}{n}$. Donc $\frac{1}{n^n}\sum_{p=1}^{n-2} p^p$. On en déduit que $\frac{1}{n^n}\sum_{p=1}^n p^p = 1+\frac{(n-1)^{n-1}}{n^n}+\frac{1}{n^n}\sum_{p=1}^{n-2} p^p \underset{n\to+\infty}{=} 1+o(1)+o(1) = 1+o(1)$.

$$\boxed{\sum_{p=1}^n p^p \underset{n\to+\infty}{\sim} n^n.}$$

Correction de l'exercice 22 ▲

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{p\}$, $\frac{1}{n^2-p^2} = \frac{1}{2p}\left(\frac{1}{n-p}-\frac{1}{n+p}\right)$. Donc pour $N > p$,

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant n\leqslant N,\, n\neq p}\frac{1}{n^2-p^2} &= \frac{1}{2p}\sum_{1\leqslant n\leqslant N,\, n\neq p}\left(\frac{1}{n-p}-\frac{1}{n+p}\right) = \frac{1}{2p}\left(\sum_{1-p\leqslant k\leqslant N-p,\, k\neq 0}\frac{1}{k}-\sum_{p+1\leqslant k\leqslant N+p,\, k\neq 2p}\frac{1}{k}\right)\\ &= \frac{1}{2p}\left(-\sum_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k}+\sum_{k=1}^{N-p}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{N+p}\frac{1}{k}+\frac{1}{2p}+\sum_{k=1}^{p}\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2p}\left(\frac{3}{2p}-\sum_{k=N-p+1}^{N+p}\frac{1}{k}\right)\end{aligned}$$

Maintenant, $\sum_{k=N-p+1}^{N+p}\frac{1}{k} = \frac{1}{N-p+1}+\ldots+\frac{1}{N+p}$ est une somme de $2p-1$ termes tendant vers 0 quand N tend vers $+\infty$. Puisque $2p-1$ est constant quand N varie, $\lim_{N\to+\infty}\sum_{k=N-p+1}^{N+p}\frac{1}{k} = 0$ et donc

$$\sum_{n\in\mathbb{N}^*,\, n\neq p}\frac{1}{n^2-p^2} = \frac{1}{2p}\times\frac{3}{2p} = \frac{3}{4p^2} \text{ puis } \sum_{p\in\mathbb{N}^*}\left(\sum_{n\in\mathbb{N}^*,\, n\neq p}\frac{1}{n^2-p^2}\right) = \sum_{p=1}^{+\infty}\frac{3}{4p^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ donné, on a aussi $\sum_{p\in\mathbb{N}^*,\, p\neq n}\frac{1}{n^2-p^2} = -\sum_{p\in\mathbb{N}^*,\, p\neq n}\frac{1}{p^2-n^2} = -\frac{3}{4n^2}$ et donc

$$\sum_{n\in\mathbb{N}^*}\left(\sum_{p\in\mathbb{N}^*,\, p\neq n}\frac{1}{n^2-p^2}\right) = -\frac{\pi^2}{8}.$$

On en déduit que la suite double $\left(\frac{1}{n^2-p^2}\right)_{(n,p)\in(\mathbb{N}^*)^2,\, n\neq p}$ n'est pas sommable.

Correction de l'exercice 23 ▲

La suite $\left((-1)^n\frac{1}{3n+1}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est alternée en signe et sa valeur absolue tend vers 0 en décroissant. Donc la série de terme général $(-1)^n\frac{1}{3n+1}$, $n \geqslant 1$, converge en vertu du critère spécial aux séries alternées.
Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=0}^n\frac{(-1)^k}{3k+1} = \sum_{k=0}^n(-1)^k\int_0^1 t^{3k}\,dt = \int_0^1\frac{1-(-t^3)^{n+1}}{1-(-t^3)}\,dt = \int_0^1\frac{1}{1+t^3}\,dt+(-1)^n\int_0^1\frac{t^{3n+3}}{1+t^3}\,dt.$$

Mais $\left|(-1)^n\int_0^1\frac{t^{3n+3}}{1+t^3}\,dt\right| = \int_0^1\frac{t^{3n+3}}{1+t^3}\,dt \leqslant \int_0^1 t^{3n+3}\,dt = \frac{1}{3n+4}$. On en déduit que $(-1)^n\int_0^1\frac{t^{3n+3}}{1+t^3}\,dt$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et donc que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 \frac{1}{1+t^3}\,dt.$$

Calculons cette dernière intégrale.

$$\frac{1}{X^3+1} = \frac{1}{(X+1)(X+j)(X+j^2)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{X+1} + \frac{j}{X+j} + \frac{j^2}{X+j^2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{X+1} + \frac{-X+2}{X^2-X+1}\right)$$
$$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{X+1} - \frac{1}{2}\frac{2X-1}{X^2-X+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{\left(X-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\right).$$

Donc,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{1}{3}\left[\ln(t+1) - \frac{1}{2}\ln(t^2-t+1) + \sqrt{3}\arctan\left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1 = \frac{1}{3}\left(\ln 2 + \sqrt{3}\left(\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)\right) = \frac{3\ln 2 + \pi\sqrt{3}}{9}.$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{3\ln 2 + \pi\sqrt{3}}{9}.}$$

Correction de l'exercice 24 ▲

Pour tout entier $n \geqslant 2$, on a $nv_n - (n-1)v_{n-1} = u_n$ ce qui reste vrai pour $n = 1$ si on pose de plus $v_0 = 0$. Par suite, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} v_n^2 - 2u_nv_n &= v_n^2 - 2(nv_n - (n-1)v_{n-1})v_n = -(2n-1)v_n^2 + 2(n-1)v_{n-1}v_n \\ &\leqslant -(2n-1)v_n^2 + (n-1)(v_{n-1}2 + v_n^2) = (n-1)v_{n-1}^2 - nv_n^2. \end{aligned}$$

Mais alors, pour $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{n=1}^{N}(v_n^2 - 2u_nv_n) \leqslant \sum_{n=1}^{N}((n-1)v_{n-1}^2 - nv_n^2) = -nv_n^2 \leqslant 0.$$

Par suite,

$$\sum_{n=1}^{N} v_n^2 \leqslant \sum_{n=1}^{N} 2u_nv_n \leqslant 2\left(\sum_{n=1}^{N} u_n^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{N} v_n^2\right)^{1/2} \text{ (inégalité de CAUCHY-SCHWARZ).}$$

Si $\left(\sum_{n=1}^{N} v_n^2\right)^{1/2} > 0$, on obtient après simplification par $\left(\sum_{n=1}^{N} v_n^2\right)^{1/2}$ puis élévation au carré

$$\sum_{n=1}^{N} v_n^2 \leqslant 4\sum_{n=1}^{N} u_n^2,$$

cette inégalité restant claire si $\left(\sum_{n=1}^{N} v_n^2\right)^{1/2} = 0$. Finalement,

$$\sum_{n=1}^{N} v_n^2 \leqslant 4\sum_{n=1}^{N} u_n^2 \leqslant 4\sum_{n=1}^{+\infty} u_n^2.$$

La suite des sommes partielles de la série de terme général $v_n^2 (\geqslant 0)$ est majorée. Donc la série de terme général v_n^2 converge et de plus, quand N tend vers l'infini, on obtient

$$\sum_{n=1}^{+\infty} v_n^2 \leqslant 4\sum_{n=1}^{+\infty} u_n^2.$$

Correction de l'exercice 25 ▲

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$u_n = \frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt - \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \int_0^1 t^{2k}\,dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt - \int_0^1 \frac{1-(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}\,dt$$
$$= (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt.$$

Par suite, pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^{N} u_n = \int_0^1 \sum_{n=0}^{N} \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}\,dt = \int_0^1 (-t^2)\frac{1-(-t^2)^{N+1}}{(1+t^2)^2}\,dt = -\int_0^1 \frac{t^2}{(1+t^2)^2}\,dt + (-1)^{N+1}\int_0^1 \frac{t^{2N+2}}{(1+t^2)^2}\,dt.$$

Or $\left|(-1)^{N+1}\int_0^1 \frac{t^{2N+2}}{(1+t^2)^2}\,dt\right| = \int_0^1 \frac{t^{2N+2}}{(1+t^2)^2}\,dt \leqslant \int_0^1 t^{2N+2}\,dt = \frac{1}{2N+3}$. Comme $\frac{1}{2N+3}$ tend vers 0 quand N tend vers $+\infty$, il en est de même de $(-1)^{N+1}\int_0^1 \frac{t^{2N+2}}{(1+t^2)^2}\,dt$. On en déduit que la série de terme général u_n, $n \in \mathbb{N}$, converge et de plus

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = -\int_0^1 \frac{t^2}{(1+t^2)^2}\,dt = \int_0^1 \frac{t}{2} \times \frac{-2t}{(1+t^2)^2}\,dt$$
$$= \left[\frac{t}{2} \times \frac{1}{1+t^2}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{1+t^2}\,dt = \frac{1}{4} - \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1}\right) = \frac{1}{4} - \frac{\pi}{8}.}$$